Acne-Derm żel 20 g

Opis

ACNE-DERM to żel przeciwtrądzikowy i wybielający z kwasem azelainowym 15% do codziennej pielęgnacji skóry z tendencją do trądziku grudkowo-krostkowego o słabym lub średnim nasileniu u młodzieży od 12 lat i dorosłych. Składniki zawarte w żelu zmniejszają stany zapalne oraz pozapalne przebarwienia potrądzikowe (świeże i utrwalone), redukują rumień. Kwas azelainowy zawarty w żelu ACNE-DERM działa przeciwbakteryjnie, szczególnie na bakterie Propionibacterium acnes, które mają wpływ na rozwój trądziku. Ponadto kwas azelainowy zmniejsza liczbę mikrozaskórników, w wyniku normalizacji procesu powstawania keratyny oraz hamowania nadmiernego rogowacenia naskórka.

Właściwości

Żel ACNE-DERM z kwasem azelainowym 15% jest żel przeciwtrądzikowy i wybielający z kwasem azelainowy 15%
kwas azelainowy eliminuje zmiany trądzikowe i zaskórniki, redukuje wydzielanie sebum, redukuje przebarwienia (świeże i utrwalone) i ujednolica koloryt skóry, łagodzi rumień. Nie zawiera kompozycji zapachowych i barwników, przebadany dermatologicznie.

Sposób użycia

- do codziennej pielęgnacji skóry z tendencją do trądziku grudkowo-krostkowego o słabym lub średnim nasileniu dla młodzieży od 12 lat i dorosłych.
- do stosowania miejscowo 2 razy dziennie (rano i wieczorem) na zmienione chorobowo miejsca skóry
- nie zawiera kompozycji zapachowych i barwników, przebadany dermatologicznie.

- Przy pojedynczych wypryskach stosować punktowo.
- W razie konieczności równoczesnego stosowania innych preparatów na skórę, zaleca się stosować je między kolejnymi podaniami (aplikacjami) żelu ACNE-DERM.
- Podczas nakładania żelu należy chronić oczy, usta oraz błony śluzowe.
- Po nałożeniu żelu należy dokładnie umyć ręce.
- Pasek o długości 2,5 cm (ok. 0,5 g żelu) wystarcza na pokrycie skóry twarzy.
- Osoby ze skórą wrażliwą przez pierwszy tydzień stosowania żelu ACNE-DERM powinny stosować żel tylko raz na dobę – wieczorem.
- W przypadku podrażnienia skóry należy zmniejszyć ilość nakładanego żelu lub stosować go raz na dobę, do czasu ustąpienia objawów podrażnienia. Jeśli to konieczne, należy przerwać stosowanie żelu na kilka dni.

Działanie

Kwas azelainowy 15% ma działanie przeciwtrądzikowe – działa przeciwbakteryjnie, szczególnie na bakterie Propionibacterium acnes, które mają wpływ na rozwój trądziku. Ponadto kwas azelainowy zmniejsza liczbę mikrozaskórników, w wyniku normalizacji procesu powstawania keratyny oraz hamowania nadmiernego rogowacenia naskórka.

Składniki

Aqua, Azelaic Acid, Propylene Glycol, Polysorbate 80, Caprylic/Capric Triglyceride, Lecithin, Carbomer, Sodium Hydroxide, Benzoic Acid, Disodium EDTA.

Działania niepożądane

Na początku stosowania żelu ANE-DERM mogą wystąpić: miejscowe podrażnienia skóry, świąd, uczucie pieczenia, zaczerwienienie i łuszczenie skóry. Jeśli objawy utrzymują się, żel należy stosować raz na dobę.

Rzadko może wystąpić: kontaktowe zapalenie skóry, zapalenie mieszków włosowych, białe plamy lub rozjaśnienie skóry w miejscu stosowania produktu u osób o ciemnej karnacji, reakcje nadwrażliwości na światło, alergiczne reakcje skórne, np. wysypka. W przypadku wystąpienia tych objawów należy przerwać stosowanie żelu.

Przeciwwskazania

- Nie należy stosować żelu ACNE-DERM w przypadku nadwrażliwości na kwas azelainowy lub pozostałe składniki produktu kosmetycznego.
- Stosowanie w ciąży i podczas karmienia piersią.
- Nie należy stosować żelu ACNE-DERM w okresie ciąży i karmienia piersią.

Zalecenia i środki ostrożności

- Tylko do użytku zewnętrznego.
- Po zastosowaniu żelu należy unikać ekspozycji na promieniowanie słoneczne.
- Należy stosować jednocześnie kremy z filtrami UVA i UVB, ponieważ promieniowanie słoneczne może nasilać zmiany trądzikowe.
- Po nałożeniu żelu należy dokładnie umyć ręce.
- Należy unikać kontaktu produktu z oczami, ustami i błonami śluzowymi.
- W przypadku kontaktu produktu z oczami, ustami i błonami śluzowymi należy je natychmiast przepłukać dużą ilością wody.
- Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.
- Preparat przebadany dermatologicznie.
- Nie zawiera kompozycji zapachowych.
- Nie zawiera barwników.

Przechowywanie

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C.
Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.