AkusTone spray do higieny uszu 15 ml

Opis

Akustone spray do uszu to wyrób medyczny, którego składniki wspierają redukcję zalegającej woskowiny w przewodzie słuchowym. Produkt dla dorosłych, dzieci i niemowląt powyżej 3 miesiąca życia.

AkusTone to wyrób medyczny przeznaczony do higieny uszu, który pomaga usuwać korki woskowinowe oraz przeciwdziałać ich powstawaniu. Spray opracowany dla dorosłych i dzieci powyżej 3. miesiąca życia.

Ze względu na formę aplikacji, produkt jest równomiernie rozprowadzany w przewodzie słuchowym, dzięki czemu nie ma konieczności głębokiego wsuwania aplikatora do ucha

Składniki

Oliwa z oliwek, olej migdałowy, olej jojoba, parafina ciekła, witamina E, polisorbat 80. Nie zawiera wody ani konserwantów.

Przeznaczenie produktu

- Dzieci i niemowlęta powyżej 3. miesiąca życia: 1 rozpylenie.
- Dorośli: 1-2 rozpylenia do przewodu słuchowego zewnętrznego.
- Rozpuszczanie korków woskowinowych: Stosować 3-5 razy dziennie, aż do rozpuszczenia zalegającej woskowiny.
- Działanie profilaktyczne oraz odpowiednia higiena uszu: Stosować 1-2 razy w tygodniu w celu zapobiegania tworzeniu się korków woskowinowych, stosować bezpośrednio przed kąpielą w celu przeciwdziałania

zaleganiu wody w uchu.

- U dzieci i niemowląt wyrób powinien być aplikowany z zachowaniem ostrożności przez osobę dorosłą. Aplikatora nie wsuwać zbyt głęboko do ucha, aby nie uszkodzić narządu słuchu.
- Po zastosowaniu wyrobu nie ma potrzeby dodatkowego przepłukiwania przewodu słuchowego.
- Przed pierwszym użyciem należy kilka razy energicznie nacisnąć pompkę dozownika w celu jego napełnienia i uzyskania prawidłowego rozpylenia wyrobu.
- Po użyciu wyrobu, końcówkę należy umyć pod bieżącą wodą i delikatnie osuszyć.

Zawartość opakowania

15 ml

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

- Nie stosować do oczu, nosa lub jamy ustnej. Ze względów higienicznych zalecane jest stosowanie wyrobu przez jedną osobę.
- Nie stosować AkusTone Spray do uszu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników.
- Nie zaleca się stosowania w przypadku chorób narządu słuchu, perforacji błony bębenkowej lub gdy w uchu znajduje się ciało obce.