

Amol płyn 250 ml

Opis:

Amol stanowi roztwór mentolu oraz mieszaniny olejków eterycznych w etanolu.

WSKAZANIA

Amol stosowany jest tradycyjnie w następujących wskazaniach:

– zewnętrze:

- * w celu poprawy złego samopoczucia np. w przebiegu przeziębienia (do nacierania),
- * w bólach głowy, bólach mięśniowych,
- * w celu zmniejszenia dolegliwości po ukąszeniach owadów.

– wewnętrznie:

- * w dolegliwościach trawiennych (dyspeptycznych) np. wzdęcia i niestrawność.

DZIAŁANIE

Działanie leku wynika z działania poszczególnych substancji czynnych: dezynfekujące, rozgrzewające, uspokajające.

Lek przeznaczony jest do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

PRZECIWWSKAZANIA

Leku Amol nie wolno stosować:

- w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku,
- w astmie oskrzelowej i innych schorzeniach dróg oddechowych, którym towarzyszy silna nadwrażliwość dróg oddechowych,
- u dzieci poniżej 12 roku życia, ze względu na brak wystarczających badań na temat stosowania leku Amol w tej grupie wiekowej.

Wewnątrznie

- w przypadku niedrożności dróg żółciowych (np. w przebiegu kamicy żółciowej), zapalenia pęcherzyka żółciowego,
- u osób z przewlekłymi chorobami wątroby, u osób uzależnionych od alkoholu.

Zewnątrznie

- na uszkodzoną skórę np. przy oparzeniach, wypryskach i ranach otwartych, przy chorobach skóry przebiegających z wysypką, na błony śluzowe oraz w okolicach oczu.

WAŻNE

Lek Amol zawiera 67% etanolu (alkoholu). Przy zastosowaniu zalecanego dawkowania po każdym przyjęciu doustnym leku w ilości 10-15 kropli do organizmu zostanie wprowadzone do 0,46 g etanolu, co jest równoważne 7,24 ml – 10,86 ml piwa (5% v/v) i 3,02 ml – 4,53 ml wina (12% v/v). Może to mieć znaczenie w przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią, dzieci, osób z grupy wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką. Szkodliwe dla osób z chorobą

alkoholową.

Należy chronić oczy przed kontaktem z lekiem. W przypadku dostania się Amolu do oczu należy obficie przemyć je wodą. W przypadku nie ustąpienia objawów należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku wystąpienia trudności w oddychaniu (np. skurcz oskrzeli) należy niezwłocznie wezwać lekarza a w przypadku wystąpienia zmian skórnych należy zasięgnąć porady lekarza.

Po natarciu roztworem leku Amol należy starannie umyć ręce. Leku nie należy stosować pod opatrunkiem utrudniającym dostęp powietrza lub w postaci okładów.

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania leku Amol w okresie ciąży i karmienia piersią.

Ze względu na zawartość etanolu, lek może wywierać wpływ na ośrodkowy układ nerwowy. Dlatego też nie zaleca się prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn po stosowaniu doustnym leku.

Alkohol zawarty w preparacie może wzmacniać lub osłabiać działanie innych leków.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Po zastosowaniu leku tak jak w przypadku wszystkich olejków eterycznych mogą ulec nasileniu objawy podrażnienia skóry i błon śluzowych. Może pojawić się lub ulec pogorszeniu kaszel i skurcz oskrzeli. U osób wrażliwych mogą wystąpić objawy żołądkowe.

W takich przypadkach należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie

wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza lub farmaceutę.

SPÓSÓB UŻYCIA

Leku nie należy stosować pod opatrunkiem utrudniającym dostęp powietrza lub w postaci okładów.

Jeżeli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skonsultować się z lekarzem.

Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia:

Zewnętrznie do nacierań w celu poprawy złego samopoczucia

Nacierać niewielką ilością leku w formie nierozcieńczonej kilka razy dziennie.

Zewnętrznie w celu zmniejszenia dolegliwości po ukąszeniach owadów

Miejsce po ukąszeniu przetrzeć wacikiem nasączonym lekiem w formie nierozcieńczonej.

Doustnie w dolegliwościach trawiennych (dyspeptycznych)

Od 10 do 15 kropli leku z płynem lub z cukrem, należy przyjmować doraźnie w przypadku wystąpienia dolegliwości, do 3 razy dziennie.

SKŁAD

1 g leku zawiera substancje czynne:

Mentholum (mentol) 17,23 mg

Citronellae aetheroleum (olejek cytronelowy) 1,00 mg

Caryophylli floris aetheroleum (olejek goździkowy) 1,00 mg

Cinnamomi zeylanici corticis aetheroleum (olejek cynamonowy)
2,40 mg

Limonis aetheroleum (olejek cytrynowy) 5,70 mg

Menthae piperitae aetheroleum (olejek mięty pieprzowej) 2,40
mg

Lavandulae aetheroleum (olejek lawendowy) 2,40 mg

oraz substancje pomocnicze: etanol 96 vol.% (638 mg), woda.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.