

Aphtin roztwór do stosowania w jamie ustnej 10 g

Wskazania:

pleśniawki – drożdżyca błony śluzowej jamy ustnej

AKCJA

Aphtin to roztwór do stosowania w jamie ustnej. Tetraboran sodu – substancja czynna leku ma łagodne działanie antyseptyczne. Dezynfekuje błonę śluzową jamy ustnej.

JAK UŻYWAĆ

O ile lekarz nie zaleci inaczej, lek stosuje się zwykle 2 do 3 razy dziennie, a dotknięte obszary rozmazuje się 1-2 kroplami.

Czas leczenia: 3-10 dni.

Stosować u dzieci powyżej 1 roku życia, nie dłużej niż 3-5 dni.

U dzieci do 1. roku życia lek należy stosować po wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

KOMPOZYCJA

1 g roztworu zawiera:

składnik aktywny: tetraboran sodu 200 mg

substancja pomocnicza: gliceryna 86%

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany stanowi zagrożenie dla Twojego życia lub zdrowia.