

# Baikadent – 15g

## BAIKADENT żel do stosowanie w jamie ustnej 15 g

- w leczeniu uzupełniającym paradontopatii powierzchniowych i głębokich
- w profilaktyce chorób przyzębia
- w przewlekłych stanach zapalnych śluzówki jamy ustnej (również przy urazach spowodowanych przez protezy).

## DZIAŁANIE

BAIKADENT jest to żel do stosowania na dziąsła w chorobach przyzębia. Stosowanie preparatu poprawia stan dziąseł. Przyjmuje się, że działanie przeciwzapalne oparte jest na hamowaniu syntezy komórkowych mediatorów stanów zapalnych (interleukiny IL-1 $\beta$ , leukotrienów, prostaglandyn) oraz na pobudzeniu aktywności fibroblastów w komórkach dziąseł. Ponadto zespół flawonów charakteryzuje się aktywnością przeciwbakteryjną (głównie na bakterie Gram-dodatnie: *Staphylococcus aureus* – gronkowiec złocisty, *Staphylococcus mutans* i inne patogenne bakterie np. *Prevotella intermedia*, dawniej *Bacteroides melaninogenicus intermedius* izolowane z jamy ustnej chorych cierpiących na przewlekłe stany zapalne śluzówki jamy ustnej) oraz przeciwgrzybicze (zwłaszcza na *Candida albicans*).

## SPOSÓB UŻYCIA

2-4 razy dziennie, bezpośrednio po umyciu zębów, ok. 2 cm żelu wcierać w miejsca chorobowo zmienione jamy ustnej i co najmniej 30 min nie jeść i nie pić.

W przewlekłych stanach zapalnych śluzówki jamy ustnej, zaleca się systematyczne stosowanie preparatu przez okres 2 tygodni. Jeżeli po tym czasie objawy zapalne nie ustąpią, należy zwrócić się do lekarza.

# WAŻNE

Ciąża i karmienie piersią

Ze względu na nieznane ryzyko stosowania preparatu Baikadent® na dżiąsła u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią, nie zaleca się stosowania.

# SKŁAD

100 g żelu zawiera:

Substancja czynna

Zespół flawonów izolowanych z korzenia *Scutellaria baicalensis*  
0,577 g

Substancje pomocnicze

Carbopol 5984, glicerol, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, glikol propylenowy, sodu wodorotlenek, sodu węglan, woda oczyszczona.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.