

Bals-Sulphur – żel – 300 g

Opis produktu

Składniki

100g żelu zawiera: 2,1% woda chlorkowo-sodowa, bromowa, jodkowa, borowa, siarczkowa -97,5g oraz mentol -100mg, etanol 70% -1,2, p-hydroksybenzoesan etylu -200mg, metyloceluloza q.s.

Dawkowanie

2-3 na dobę wcierać w skórę w okolicy chorych stawów i mięśni, lekko masując. Zaleca się stosować przez 2-3 tygodnie. Leczenie można powtarzać. Po użyciu preparatu szczelnie zamknąć butelkę.

Działanie

Żel zawiera aktywne biologicznie związki siarki: siarkę dwuwartościowej (S^{2-}), jon wodorosiarczkowy (SH^-); siarkę koloidalną oraz liczne jony: wapnia, magnezu, sodu, potasu, chlorki, jodki, bromki i inne pierwiastki śladowe. Solanka siarczkowa w kontakcie ze skórą tworzy tzw. „płaszcz solny” doprowadzając do zmian ładunku elektrycznego skóry, co powoduje lepsze wchłanianie składników leczniczych. Działanie solanki wspomaga dodany do żelu mentol, który także wspomaga przenikanie substancji aplikowanych miejscowo na skórę.

Wskazania

choroba zwyrodnieniowa stawów i kręgosłupa, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, bólowe zespoły szyjne, barkowe i lędźwiowo – krzyżowe, bóle, obrzęki po stłuczeniach, zwichnięciach i w rehabilitacji po urazach narządu ruchu, pomocniczo w reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS). Żel może być stosowany w zabiegach jonoforezy (katoda) oraz fonoforezy (ultradźwięki) w chorobie zwyrodnieniowej stawów i zapaleniu okołostawowym.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane,

choć nie u każdego one występują.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.