

Benzacne żel 100 mg/g na trądzik – 20g

Benzacne żel 100 mg/g na trądzik – 20g

Benzacne w postaci żelu o działaniu przeciwtrądzikowym, przeznaczonym do stosowania miejscowego na skórę. Zawiera substancję czynną benzoilu nadtlenuk. Benzoilu nadtlenuk po zastosowaniu na skórę łatwo przenika do warstwy rogowej naskórka i hamuje rozwój bakterii beztlenowych *Propionibacterium acnes*, będących jedną z przyczyn trądziku pospolitego. Działa on także złuszcząco na naskórek, zmniejsza liczbę zaskórników.

Benzacne jest wskazany w leczeniu różnych postaci trądziku pospolitego (*Acne vulgaris*).

Substancja czynna: Benzoylis peroxidum

Składniki:

Substancją czynną jest benzoilu nadtlenuk. 1 g żelu zawiera 50 mg lub 100 mg benzoilu nadtlenuku.

Pozostałe składniki to: karbomer, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

Stosowanie:

Należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka:

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

Stosować raz lub dwa razy na dobę. Zwykle w ciągu 2 do 3 pierwszych tygodni leczenia stosuje się benzacne o zawartości nadtlenuku benzoilu 50 mg/g i w razie konieczności kontynuuje stosować benzacne o zawartości nadtlenuku benzoilu 100 mg/g.

Sposób podawania:

przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę. Po umyciu i osuszeniu skóry, na chorobowo zmienione miejsca nanieść niewielką, wystarczającą do ich pokrycia, ilość benzacne i delikatnie wetrzeć. Po zastosowaniu należy umyć ręce.

Objawem nadmiernego stosowania Benzacne jest rumień lub obrzęk skóry. W przypadku ich wystąpienia należy natychmiast zaprzestać stosowania i skontaktować się z lekarzem. Na podrażnione miejsca można zastosować zimne okłady.

Pominięcie zastosowania Benzacne

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Stosowanie Benzacne u dzieci i młodzieży

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Przeciwwskazania:

Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników.

Jeśli występują wypryski (egzema), przewlekłe zapalenie skóry, oparzenia skóry, również wywołane nadmierną ekspozycją na słońce.