

Boiron Stodal syrop na kaszel 200 ml

Opis produktu

Syrop Stodal jest lekiem homeopatycznym stosowanym przy leczeniu kaszlu różnego pochodzenia, towarzyszącego infekcjom górnych dróg oddechowych. Zapakowany jest w szklaną butelkę o pojemności 200ml z dołączoną miarką dozującą.

Wskazania

Leczenie kaszlu różnego pochodzenia.

Skład

100g syropu zawiera:

- substancje czynnymi: pulsatilla 6CH 0,95g, rumex crispus 6CH 0,95g, bryonia 3CH 0,95g, ipeca 3CH 0,95g, spongia tosta 3CH 0,95g, sticta pulmonaria 3CH 0,95g, antimonium tartaricum 6CH 0,95 g, Myocardium 6CH 0,95g, Coccus cacti 3CH 0,95 g, Drosera TM 0,95g
- pozostałe składniki: karmel, kwas benzoesowy, etanol, syrop tolutański, syrop z krzyżownicy, roztwór sacharozy.

Działanie

Lek łagodzi kaszel różnego pochodzenia.

Dawkowanie

- **Dzieci poniżej 6 roku życia:** według wskazań lekarza.
- **Dzieci powyżej 6 lat:** 5ml syropu 3-5 razy dziennie.
- **Dorośli:** 15ml syropu 3-5 razy dziennie.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na którykolwiek ze składników leku.
- Osoby z chorobą alkoholową.

Przechowywanie

- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce.
- Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.
- Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Działania niepożądane

Lek Stodal może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- W przypadku wystąpienia gorączki powyżej 39°C, uporczywego kaszlu, duszności lub innych niepokojących objawów należy skontaktować się z lekarzem.
- Przed rozpoczęciem stosowania syropu u dzieci w wieku do 6 lat należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.
- Kobiety w ciąży lub karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
- Pacjenci z chorobą wątroby lub padaczką powinni skonsultować się z lekarzem.
- Ze względu na zawartość sacharozy stosować ostrożnie u pacjentów z cukrzycą.
- W przypadku występowania nietolerancji niektórych cukrów należy skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

Podmiot odpowiedzialny

BOIRON SA
2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 Messimy

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.