

Brodacid (100 mg + 63 mg + 20 mg)/g płyn na brodawki 8 g

Brodacid płyn do leczenia brodawek – 8g

Działanie

Preparat do stosowania miejscowego o działaniu keratolitycznym. Wykazuje ponadto działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. Dimetylosulfotlenek zawarty w preparacie ułatwia wchłanianie kwasów salicylowego i mlekowego.

Wskazania

Preparat stosowany w celu likwidacji brodawek zwykłych, okołopaznokciowych, mozaikowych, brodawek stóp.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Ciąża i okres karmienia piersią. Nie stosować do leczenia brodawek płaskich oraz zmian zlokalizowanych w okolicy oczu, na twarzy i błonach śluzowych. Nie stosować na znamiona oraz na zainfekowaną lub zmienioną zapalnie skórę.

Działania niepożądane

Podczas nieprawidłowego stosowania leku, w obrębie skóry otaczającej brodawkę mogą wystąpić nadżerki (pozostawiające przemijające przebarwienia) i pieczenie.

Stosowanie

Zewnętrznie. Czystą i suchą powierzchnię brodawki smarować płynem (używając aplikatora) 2 razy na dobę. Płyn nie powinien mieć kontaktu ze zdrową skórą. Po aplikacji odczekać, aż płyn zaschnie w postaci białej błonki. Czas leczenia, w zależności od efektów, wynosi od kilkunastu dni do 6-8 tygodni.

Skład

100 g płynu zawiera 6,3 g 80% kwasu mlekowego i 10 g kwasu salicylowego.

Substancje pomocnicze: dimetylosulfotlenek, nitroceluloza (2:1 w etanolu), octan etylu.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Brodacid płyn do leczenia brodawek – 8g