Cebion krople witamina C dla dzieci od 28 dnia życia 30 ml

Opis

Cebion krople witamina C dla dzieci od 28 dnia życia zawiera witaminę C (kwas askorbinowy), przeznaczony dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Produkt wspiera organizm poprzez profilaktyczne dostarczanie witaminy C oraz leczenie jej niedoborów. Jest przeznaczony do zapobiegania i leczenia niedoboru witaminy C, gdy odpowiednia dieta nie wystarcza.

Składniki

Substancją czynną jest kwas askorbowy (witamina C). Pozostały składnik to: glicerol 87%.

Dawkowanie

Cebion krople witamina C dla dzieci od 28 dnia życia:

– należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza.

– W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

– małych dzieci do 3 roku życia lek należy podawać po uzgodnieniu z lekarzem.

– Jeśli nie występuje konieczność innego dawkowania:

- niemowlętom i małym dzieciom (od 28 dnia życia do końca 23 miesiąca życia) podaje się 5 – 8 kropli na dobę, najlepiej dodając krople do butelki lub na łyżkę mleka, herbaty lub soku owocowego.
- dzieci (od 24 miesiąca życia do końca 11 roku życia) powinny

przyjmować 10 kropli na dobę.

- młodzież (od 12 roku życia) i dorośli 15-20 kropli na dobę.
- W razie większego zapotrzebowania na witaminę podane dawki można przyjmować dwa razy na dobę.

Działanie

Witamina C uczestniczy w wielu reakcjach enzymatycznych, w tym w syntezie kolagenu i katecholamin oraz w hydroksylacji steroidów, tyrozyny i substancji egzogennych. Wspomaga wchłanianie soli żelaza, hamuje reakcje wolnorodnikowe i działa antyoksydacyjnie, współdziałając z witaminami E, A oraz karotenoidami.

Wskazania

Cebion służy do zapobiegania i uzupełniania niedoborów witaminy C, gdy dieta nie pokrywa zapotrzebowania organizmu. Produkt w formie kropli jest odpowiedni dla niemowląt od 28. dnia życia oraz dla dzieci.

Kiedy nie stosować

Nie należy stosować jeśli:

– pacjent ma uczulenie na kwas askorbowy lub na którykolwiek z pozostałych składników tego

– pacjent ma kamicę nerkową,

– u pacjenta stwierdzono zwiększone stężenie kwasu moczowego w wywiadzie,

– u pacjenta występują zaburzenia spichrzania żelaza (gromadzenia w organizmie),

– u pacjenta występuje choroba wrzodowa żołądka.

Działania niepożądane

Może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. W pojedynczych przypadkach obserwowano reakcje nadwrażliwości skórnej oraz ze strony układu oddechowego.

Zwłaszcza przy stosowaniu dużych dawek obserwowano występowanie bólu głowy, zaburzeń żołądkowo-jelitowych (np. nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha, niestrawność) oraz wielomocz.

Długotrwałe stosowanie zwiększonych dawek może powodować kamicę nerkową.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ostrożność należy zachować w przypadku:

– wady enzymatycznej krwinek czerwonych np. niedoboru erytrocytarnej dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej – nie należy stosować dużych dawek kwasu askorbowego (4 g na dobę),

– ciężkiej lub schyłkowej niewydolności nerek – duże dawki kwasu askorbowego mogą przyczynić się do tworzenia kamieni moczowych,

Stosowanie

- Należy poinformować lekarza w przypadku stosowania leków zobojętniających sok żołądkowy (antacida), zawierających glin, szczególnie przy współistniejącej niewydolności nerek (kwas askorbowy zwiększa wchłanianie glinu w przewodzie pokarmowym).
- Jednoczesne stosowanie salicylanów może zwiększać nerkowe wydalanie kwasu askorbowego.
- Jednoczesne stosowanie deferoksaminy może nasilać toksyczne działanie żelaza na tkanki, zwłaszcza serca, powodując jego niewydolność.
- Duże stężenie kwasu askorbowego może wpływać na wyniki różnych badań

laboratoryjnych (oznaczanie glukozy, kwasu moczowego, kreatyniny, fosforanów nieorganicznych). Takie stężenia mogą być osiągane w moczu po dawkach powyżej 1g. Również wykrywanie utajonej krwi w kale może dawać fałszywie ujemne wyniki po dawkach powyżej 1g.

- Zafałszowane mogą być także inne chemiczne metody wykrywania oparte na reakcjach barwnych.

Ciąża i karmienie piersią

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem.
- nie powinien być stosowany u kobiet w ciąży bez nadzoru lekarza.
- Kwas askorbowy przenika przez barierę łożyskową i do mleka ludzkiego.
- Nie należy przekraczać ustalonej dawki w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i maszyn

Nie obserwowano wpływu witaminy C na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.