

# Cicatridina globulki dopochwowe z kwasem hialuronowym – 10sztuk

Cicatridina globulki dopochwowe z kwasem hialuronowym – 10sztuk

CICATRIDINA preparat wspomagający proces regeneracji błony śluzowej pochwy w stanach atrofii i dystrofii. Wspomaga gojenie się ran po porodzie, zabiegach ginekologicznych, dystrofii spowodowanej chemioterapią lub naświetlaniem jonizującym oraz w przypadku suchości pochwy, wywołanej również niedoborem estrogenów.

## Działanie

Przyspiesza zabliznianie się ran w pochwie; przywraca naturalny proces gojenia; odbudowuje błonę śluzową pochwy w procesach atrofii i dystrofii; łagodzi takie objawy jak: uczucie napięcia i suchości pochwy, świąd, pieczenie, bóle przy współżyciu płciowym – już w pierwszym tygodniu stosowania

## Wskazania

po porodzie, po zabiegach ginekologicznych, po zabiegach chirurgicznych, po chemio- i radioterapii – stosować 1 globulkę wieczorem przez 10-20 dni

przy suchości pochwy, w okresie przed i menopauzalnym, stanach zmniejszonego wydzielania estrogenów – stosować 1 globulkę wieczorem przez 10 dni, następnie co 2-3 dzień

Cicatridina globulki dopochwowe mogą być stosowane przez dłuższy czas.

## Skład

Cicatridina globulki dopochwowe oprócz kwasu hialuronowego – naturalnej substancji występującej w organizmie człowieka – zawierają także:

wyciąg olejowy z wąkrotki azjatyckiej – stymuluje proces gojenia ran,

wyciąg olejowy z nagietka – działa przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo,

wyciąg olejowy z aloesu – hamuje proces zapalny,

olejek z drzewa herbacianego – działa antybakteryjnie

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania,

przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.