

Collaflex Osteum 60 kapsułek

Collaflex Osteum 60 kapsułek

Opis

Collaflex Osteum to suplement diety opracowany dla osób dorosłych. W składzie preparatu znajdziesz witaminy: C, D i K, a także siarczan chondroityny, kolagen typu II czy kwas hialuronowy.

Składniki

Collatrin® (zhydrolizowane składniki macierzy międzykomórkowej tkanki chrzęstnej: kolagen typu II, siarczan chondroityny, kwas hialuronowy), żelatyna (składnik otoczki), kwas L-askorbinowy (witamina C), substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, inulina, cholekalcyferol (witamina D), menachinon (witamina K), substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, barwnik: tlenki i wodorotlenki żelaza.

Składniki	2 kapsułki	% RWS*
Collatrin, w tym:	700 mg	—
kolagen typu II	420 mg	—
Siarczan chondroityny	140 mg	—
Kwas hialuronowy	70 mg	—
Witamina C	100 mg	125%
Witamina K2 MK-7	50 µg	67%
Witamina D3	50 µg (2000 j.m.)	1000%

*%RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

Właściwości składników

W składzie suplementu diety Collaflex Osteum znajdziesz:

- **Witaminę D**, która wspiera pracę mięśni, utrzymanie prawidłowego poziomu wapnia we krwi, a także pomaga w prawidłowym wchłanianiu i wykorzystywaniu wapnia i fosforu w organizmie.
- **Witamina K i D**, które wspierają zdrowie kości.
- **Witamina C**, która bierze udział w produkcji kolagenu zapewniając prawidłowe funkcjonowanie chrząstki i kości. Wspiera też ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym.

Zalecane dzienne spożycie

Dorośli: 1 kapsułka 2 razy dziennie.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

- Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
- Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
- Suplement diety jest środkiem spożywczym, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety. Suplement diety nie ma właściwości leczniczych.
- Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.