Delicol krople na kolkę niemowlęcą 15 ml

Opis

Delicol w postaci kropli jest przeznaczony do postępowania dietetycznego w stanach przejsciowych dolegliwości trawiennych spowodowanych nietolerancją laktozy w pożywieniu u niemowląt. Niedobór laktazy może skutkować przejściowymi dolegliwościami trawiennymi spowodowanymi nietolerancją laktozy w pożywieniu u niemowląt. Składniki Delicolu rozkładają laktozę zawartą w mleku i sprawiają, że staje się ono lepiej przyswajalne, dzięki temu eliminujne dolegliwości kolkowe.

Zastosowanie

Dla niemowląt do postępowania dietetycznego w stanach przejściowych dolegliwości trawiennych spowodowanych nietolerancją laktozy w pożywieniu. Może być stosowany zarówno podczas karmienia piersią, jak również podczas karmienia mlekiem modyfikowanym.

Sposób użycia

Ilość kropli produktu dodawana do posiłku powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb organizmu. Z tego powodu zaleca się aby początkowo stosować minimalna ilość kropli określoną poniżej, w przypadku braku skuteczności stopniowo zwiększać porcję maksymalnie do górnej wartości podanych przedziałów.. Wstrząsnąc przed użyciem. Od 0 do 2 tygoni- 7-8 kropli, od 3 do 4 tygodni – 8-9 kropli; od1 do 2 miesięcy – 9-11 kropli; od 2 do 3 miesięcy od 11-14 kropli; od 3 do 4 miesięcy – 12-15 kropli; powyżej 4 miesięcy – 14-17 kropli.

Składniki

Maltoza, woda, sacharoza, maltodekstryna, chlorek sodu, enzym laktaza z naturalnego pochodzenia z wyciągu z grzyba Aspergillus oryzae. 100ml produktu zawiera:
– wartość energetyczna: 1344,7kJ/320,7kcal;
– tłuszcz poniżej 0,1g w tym kwasy tłuszczowe nasycone poniżej 0,1 g; węglowodany 78.3 g w tym cukry 55,1 g,białko 1,97 g,sól 0,07; laktaza 1,57 g.

Ważne wskazówki

- Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
- Produkt jest niekompletnym środkiem spożywczym.
- Nie może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
- Nie narażać na działanie promieni słonecznych i ciepła.
- Po otwarciu preparat powinien być zużyty w ciągu 3 tygodni.
- W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u dziecka, należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.
- Nie dodawać kropli Delicol do mleka, które jest bardzo ciepłe albo bardzo zimne.
- Delicol zawiera enzym laktazę, który ulega zniszczeniu pod wpływem wysokiej temperatury.
- Zaleca się, by krople dodawać do pokarmu w temperaturze pokojowej.

Zawartość netto

15ml