

Dentosept A spray 25 g

DENTOSEPT A płyn z aplikatorem 25g

Dentosept A to produkt leczniczy zawierający ekstrakty roślinne i benzokainę. Wskazaniem do stosowania jest leczenie stanów zapalnych jamy ustnej i rufy. Opakowanie z wygodnym aplikatorem, który umożliwia precyzyjne dozowanie preparatu.

Kompozycja:

100g produktu zawiera: wyciąg płynny (0,65:1) z koszyczka rumianku (*Matricaria recutita* L.), kory dębu (*Quercus* spp.), liścia szalwii (*Salvia officinalis* L.), ziela arniki (*Arnica montana* L.), kłącza tataraku (*Acorus calamus* L.), ziele mięty pieprzowej (*Mentha piperita* L.), ziele tymianku (*Thymus* spp.) (2/2/2/1/1/1/1), rozpuszczalnik do ekstrakcji: etanol 70 % (V / V) – 50g Benzocainum – 2g. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: etanol. Produkt zawiera 35-45% (V/V) etanolu (alkoholu).

Akcja:

Kompozycja płynnych ekstraktów z kory dębu, koszyczka rumianku, ziela arniki, liści szalwii, ziela mięty pieprzowej, ziela tymianku i kłącza tataraku oraz benzokainy. Tradycyjnie Dentosept A jest stosowany jako środek znieczulający, dezynfekujący, przeciwbakteryjny i przeciwzapalny. Skuteczność preparatu w leczeniu stanów zapalnych dziąseł i jamy ustnej, owrzodzeń jamy ustnej i rufowej opiera się na długim okresie stosowania.

Aplikacja:

Dentosept A z aplikatorem wskazany do stosowania w leczeniu stanów zapalnych dziąseł i jamy ustnej, wrzodów rufowych, odleżynowych (po protezach zębowych), do użytku pomocniczego w paradontozie. Do stosowania u osób dorosłych i młodzieży powyżej 12. roku życia.

Dodatkowe informacje:

Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci w temperaturze pokojowej. Lek zawiera etanol, dlatego zaraz po aplikacji należy zrezygnować z prowadzenia pojazdu. Stosowanie leku u kobiet w okresie ciąży i laktacji należy skonsultować z lekarzem.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu – na rumianek, arnikę lub na inne rośliny z

rodziny Asteraceae (Asteraceae, dawniej Compositae), korę dębu, kłącze tataraku, miętę, liść szałwii, tymianek. Nie stosować u dzieci poniżej 12 roku życia.

Działania niepożądane: Działania niepożądane

u niektórych osób może wystąpić: przejściowe przebarwienie zębów i błony śluzowej jamy ustnej (znika po umyciu zębów), przemijające krótkotrwałe uczucie pieczenia bezpośrednio po aplikacji, methemoglobinemia, a u osób uczulonych na benzokainę może wystąpić nadwrażliwość reakcyjna.

Dawkowanie:

Stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub instrukcjami na ulotce. Aplikować aplikatorem na błonę śluzową jamy ustnej, zachowując odległość około 1-5 cm między końcówką aplikatora a błoną śluzową. Bezpośrednio po aplikacji nie należy płukać ust. O ile lekarz nie zaleci inaczej, zaleca się podanie jednej dawki preparatu w chore miejsce u osób dorosłych i młodzieży powyżej 12 roku życia, do 5-krotnej dawki 5 dawek na różne chorobowo miejsca, do 3-krotnej dawki dzień. Nie przekraczać maksymalnej porcji dziennej, która wynosi 15 porcji. Lek można stosować przez 7 dni bez konsultacji z lekarzem. Jeśli objawy nie ustąpią lub się pogorszą, należy udać się na wizytę lekarską.