Dentosept koncentrat do stosowania w jamie ustnej 100 ml

Opis

Dentosept jest przeznaczony do stosowania jako środek przeciwzapalny, przeciwbakteryjny, odkażający i ściągający w obrębie jamy ustnej i gardła.

Składniki

Substancje czynne: wyciąg płynny złożony z: koszyczka rumianku (Matricariae flos), kory dębu (Quercus cortex), liścia szałwi (Salviae folium), ziela arnika (Arnica herba), kłącza tataraku (Calami rhizomate), ziela mięty pieprzowej (Menthae piperitae herba), ziela tymianku (Thymi herba); benzokaina. 100 g produktu zawiera wyciąg płynny złożony (0,65:1) z: koszyczka rumianku (Matricariae flos), kory dębu (Quercus cortex), liścia szałwi (Salviae folium), ziela arnika (Arnica herba), kłącza tataraku (Calami rhizomate), ziela mięty pieprzowej (Menthae piperitae herba), ziela tymianku (Thymi herba) (2/2/2/1/1/1/1) 2 g benzokainy. Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70% (V/V).

Dawkowanie

- Dentosept należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.
- Dorośli: należy stosować 15% roztwór wodny leku; odmierzyć 10 ml (do niższej kreski) za pomocą dołączonej miarki i uzupełnić wodą (do wyższej kreski).
- Młodzież i dzieci powyżej 6 roku życia: po konsultacji z lekarzem stosować rozcieńczenie 10 ml odmierzone za pomocą dołączonej miarki w szklance wody.

- Przeznaczony do płukania jamy ustnej. Stosować przez 7 dni, w przypadku gdy objawy nasilają się lub nie ustępują, należy skonsultować się z lekarzem.
- Dentosept może być stosowany do ustąpienia objawów.

Działanie

– Przeciwzapalne- Przeciwbakteryjne- Odkażające- Ściągające

Wskazania

Dentosept tradycyjnie stosowany w zapaleniu dziąseł i jamy ustnej (w tym przy zapaleniu języka), powierzchniowym zapaleniu przyzębia, jako środek ściągający, przeciwbakteryjny i przeciwzapalny, w skłonności do krwawienia z dziąseł i pomocniczo w parodontozie jako środek ściągający. Produkt przeznaczony do stosowania tradycyjnego w wymienionych wskazaniach, a jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Kiedy nie stosowa:

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub inne rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae, dawniej złożonych Compositae).
- Nie podawać dzieciom poniżej 6 lat.

Działania niepożądane

Brak informacji dotyczących skutków ubocznych czy działań niepożądanych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Bezpośrednio po zastosowaniu alkohol może być wykrywany przez urządzenia do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu, z tego względu nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn bezpośrednio po zastosowaniu produktu. Należy zachować co najmniej półgodzinną przerwę.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem.

Prowadzenie pojazdów i maszyn

Bezpośrednio po zastosowaniu alkohol może być wykrywany przez urządzenia do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu, z tego względu nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn bezpośrednio po zastosowaniu produktu. Należy zachować co najmniej półgodzinną przerwę.