

Detramax, 60 tabletek powlekanych

Opis produktu

Suplement diety Detramax zawierający zmikronizowaną frakcję flawonoidową zawierającą 90% diosminy i 10% hesperydyny, ekstrakt z liści winorośli właściwej, ekstrakt z pestek winogron standaryzowany na 95% proantocyjanidyn oraz witaminę C. Witamina C pomaga w produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych oraz pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Zastosowanie

Suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie

1 tabletkę powlekaną dwa razy dziennie. Przyjmować w trakcie lub po posiłku rano i wieczorem. Popić wodą.

Składniki

Zmikronizowana frakcja flawonoidowa zawierająca 90% diosminy i 10% hesperydyny; substancja wypełniająca – celuloza mikrokryształiczna, ekstrakt z liści winorośli właściwej (Vitis

vinifera L.), ekstrakt z pestek winogron (Vitis vinifera L.) zawierający 95% proantocyjanidyn, witamina C (kwas L-askorbinowy), substancja przeciwzbrylająca – sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja wypełniająca – sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, substancja przeciwzbrylająca – dwutlenek krzemu, substancja glazurująca – sorbitol, substancja przeciwzbrylająca – kwasy tłuszczowe, substancje glazurujące – guma arabska i karagen.

porcja dzienna (2 tabletki) zawiera: zmikronizowana frakcja flawonoidowa 90:10 445mg, w tym: diosmina 400,5mg, hesperydyna 44,5mg; ekstrakt z liści winorośli właściwej 168mg; ekstrakt z pestek winogron 158mg, w tym: proantocyjanidyny 95% 150,1mg; witamina C 80mg (100%)*.

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia.

Ważne wskazówki

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem.

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej (15-25°C), w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Chronić przed światłem i wilgocią.

Producent

Novascon Pharmaceuticals Sp. z o.o.,
Al. Jana Pawła II 80,
00-175 Warszawa.