

Dicopeg Junior od 6. miesiąca życia 30 saszetek

Dicopeg Junior 30 saszetek po 5 g

Opis produktu

dicopeg Junior jest szczególnie zalecany w przypadku przewlekłych zaparc oraz w przypadku sporadycznych zaburzeń pracy jelit. Jest wyrobem medycznym o osmotycznym działaniu przeczyszczającym, który w sposób naturalny reguluje pracę jelit. Dzięki swoim właściwościom hydrofilowym Dicopeg Junior zmiękcza stolec ułatwiając wypróżnienie przy czym nie powoduje skurczów, bólów brzucha ani nagłego parcia. Skuteczność wyrobu nie zmniejsza się z upływem czasu. Nie jest wchłaniany i nie ulega fermentacji w jelitach. Nie podrażnia błony śluzowej. Jest wydalany z kałem w niezmienionej formie.

Zastosowanie

Do stosowania w przypadku przewlekłych zaparc oraz w przypadku sporadycznych zaburzeń pracy jelit.

Sposób użycia

Od 6. miesiąca życia do 2. lat (do 12kg): 1-2 saszetki dziennie; od 2. do 11. roku życia (12-20kg): 2-4 saszetki dziennie; powyżej 11. roku życia (> 20kg): 2-6 saszetek dziennie.

Dawkę można zwiększyć lub zmniejszyć w zależności od indywidualnej reakcji pacjenta na leczenie. Zaleca się w tym celu skonsultować z lekarzem. Przed podawaniem produktu małym

dzieciom należy zawsze skonsultować się z lekarzem. Zazwyczaj największa potrzebna dawka dzienna nie przekracza 6 saszetek. Należy rozpuścić zawartość saszetki w 1/2 szklanki wody (62,5ml) i wypić sporządzony roztwór. Dawkę dzienną można zażywać w kilku podaniach. Można rozpuścić wszystkie saszetki przewidziane na dany dzień w odpowiedniej ilości wody i wstawić roztwór w zamkniętym pojemniku do lodówki na okres nie dłuższy niż 24 godziny. Zaleca się zażywać Dicopeg Junior w długich odstępach czasu od posiłków.

Składniki

1 saszetka (5g) zawiera: 5g makroglu 3350 oraz substancje pomocnicze.

Ważne wskazówki

Nie należy stosować Dicopeg Junior w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na makrogl, w przypadku perforacji i/lub niedrożności układu pokarmowego, zmian chorobowych układu pokarmowego lub wydalniczego, poważnych chorób zapalnych jelit, takich jak choroba Leśniewskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, ostre rozdęcie okrężnicy.

Nie stwierdzono interakcji preparatu z innymi lekami, niemniej zaleca się zażywanie Dicopeg Junior w odstępie co najmniej 2 godzin od zażycia innych leków doustnych, ponieważ działanie osmotyczne makroglu oraz przyspieszenie pasażu jelitowego mogą zmniejszyć ich skuteczność.

W trakcie leczenia innymi lekami, zaleca się skonsultowanie z lekarzem przed rozpoczęciem zażywania Dicopegu Junior.

Dodatkowe informacje

Produkt nie zawiera glutenu.