Dicopeg proszek do sporządzania roztworu doustnego 14 saszetek

Opis

Dicopeg proszek do sporządzania roztworu doustnego to wyrób medyczny w formie proszku do przygotowania roztworu doustnego, który pomaga w łagodzeniu zaparć i przywracaniu regularnych wypróżnień, zwiększając objętość stolca i ułatwiając jego naturalne przesuwanie się przez jelita, co zapewnia komfort jelitowy u dorosłych oraz u dzieci powyżej 6. miesiąca życia, wspierając prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego w codziennej diecie i w sytuacjach tymczasowych zaburzeń rytmu wypróżnień.

Składniki

Dicopeg proszek do sporządzania roztworu doustnego zawiera Makrogol 3350. Substancje pomocnicze: dwutlenek krzemu, aromat, sól sodowa sacharyny. Nie zawiera glutenu.

Przeznaczenie produktu

Dicopeg to ułatwiający wypróżnianie wyrób medyczny zalecany do stosowania w przypadku przewlekłych zaparć oraz w przypadku sporadycznych zaburzeń pracy jelit. Dla niemowląt, dzieci i dorosłych. Może być stosowany od 6. miesiąca życia.

Charakterystyka produktu

Dicopeg wspiera naturalną regulację pracy jelit. Preparat zmiękcza stolec i ułatwia wypróżnianie, działając delikatnie i

skutecznie, bez wywoływania bólu, skurczów czy nagłego parcia. Substancja czynna nie jest wchłaniana ani fermentowana w jelitach, dzięki czemu działa miejscowo i zachowuje pełną skuteczność nawet przy długotrwałym stosowaniu. Produkt może być stosowany zarówno u dorosłych, jak i u dzieci powyżej 6. miesiąca życia, wspomagając komfort jelitowy i przywracając regularny rytm wypróżnień w naturalny sposób.

Sposób użycia

Dzieci 6. miesiąca życia do 2 lat (do 12 kg): 1 saszetka/dobę Dzieci 2. do 11. roku życia (od 12 kg do 20 kg): 1-2 saszetki/dobę Dzieci powyżej 11. roku życia (lub > 20 kg): 1-3 saszetki/dobę Należy rozpuścić zawartość saszetki w 1 szklance wody (125 ml) i wypić sporządzony roztwór.

Zawartość opakowania

14 saszetek

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik suplementu.
- Nie stosować preparatu w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na makrogol, w przypadku perforacji i/lub niedrożności układu pokarmowego, zmian chorobowych układu pokarmowego lub wydalniczego, poważnych chorób zapalnych jelit, takich jak choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, ostre rozdęcie okrężnicy.
- W okresie ciąży i karmienia piersią produkt stosuje się tylko po przepisaniu przez lekarza.