Doppelherz Aktiv Na skurcze 30 tabletek

Działanie:

Potas i magnez uczestniczą w prawidłowym przewodnictwie nerwowo-mięśniowym i w mechanizmie skurczu mięśni. Oba pierwiastki są ważnymi elektrolitami, których odpowiednia podaż jest szczególnie niezbędna podczas intensywnego wysiłku i przy utracie płynów.Do stosowania przy utracie elektrolitów w wyniku intensywnego wysiłku fizycznego i pocenia się, zwiększonym oddawaniu moczu, wymiotach itp. , nieprawidłowej diecie (nadmiar węglowodanów i białek o działaniu zakwaszającym), piciu znacznych ilości kawy, osłabieniu organizmu (stany zmęczenie i znużenia).

Potas – poprzez wpływ na prawidłową pracę mięśni gładkich – uczestniczy również w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi.

Cynk pomaga w zachowaniu równowagi kwasowo-zasadowej w organizmie. Chrom przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu glukozy we krwi.

Żelazo, witaminy B6, B12 uczestniczą w metabolizmie energetycznym i redukują skutki zmęczenia. Dodatkowo witaminy B6 i B12 umożliwiają wytwarzanie czerwonych krwinek, a żelazo umożliwia transport tlenu przez krew.

Preparat odpowiedni dla wegan i wegetarian.

Nie zawiera laktozy i glutenu.

Składniki:

wodorowęglan potasu (diwęglan potasu), tlenek magnezu (Mg), substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna,

stabilizator: guma celulozowa usieciowana, subst. zagęszczająca: hydroksypropylometyloceluloza, nośnik: kwasy tłuszczowe, siarczan cynku (Zn), siarczan żelaza (Fe II), emulgator: sól magnezowa kwasów tłuszczowych, stablilizator: hydroksypropyloceluloza, chlorowodorek pirydoksyny (wit. B_6), subst. przeciwzbrylające: talk i dwutlenek krzemu; cyjanokobalamina (wit. B_{12}), talk i dwutlenek krzemu; cyjanokobalamina (wit. B_{12}), olej rzepakowy uwodorniony, barwniki: tlenki i wodorotlenki żelaza; chlorek chromu (Cr III).

Składniki	**Zawartość w 1 tabletce (%RWS)**
Magnez	300 mg (80%)
potas	300 mg (15%)
Cynk	5 mg (50%)
Żelazo	3,5 mg (25%)
Chrom	30 µg (75%)
Witamina B6	4 mg (286%)
Witamina B12	2 µg (80%)

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

Zalecana porcja:

1 tabletka dziennie po posiłku, popijając obficie. Tabletkę można dzielić dla łatwiejszego połykania. Nie stosować na czczo. Przy długotrwałym stosowaniu (ponad 1 miesiąc) zaleca się ½ tabletki dziennie.

Opakowanie:

Opakowanie zawiera 30 tabletek .

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu niedostępnym dla dzieci.

Uwagi:

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Nie należy przekraczać zalecanej dawki.
Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu. Skonsultować stosowanie z lekarzem w przypadku: nadciśnienia i innych chorób układu krążenia lub nerek, choroby wrzodowej; przy częstym stosowaniu leków przeciwzapalnych. Nie łączyć z innymi preparatami zawierającymi potas. Nie zaleca się stosowania u dzieci.