

Emotopic 3-zadaniowa pianka myjąca do twarzy ciała i włosów 200 ml

Emotopic 3-zadaniowa pianka myjąca do twarzy ciała i włosów 200 ml

Opis

Emotopic 3-zadaniowa pianka myjąca do twarzy ciała i włosów – wyrób medyczny zawierający składniki zapobiegające objawom atopowego zapalenia skóry (AZS) takim jak suchość skóry, podrażnienia, zaczerwienienia oraz objawom towarzyszącym reakcjom alergicznym.

Składniki

Aqua (Water), Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Myreth Sulfate, Betaine, Disodium Undecylenamido MEA- Sulfosuccinate, PPG-26-Buteth-26, Polyquaternium-10, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Disodium EDTA, Xanthan Gum, Sodium Carbonate, Calcium Gluconate, Gluconolactone, Sodium Benzoate, Parfum (Fragrance).

Przeznaczenie

Emotopic 3-zadaniowa pianka do twarzy, ciała i włosów polecana jest do codziennego mycia suchej i wrażliwej skóry twarzy oraz ciała, w tym skóry głowy dzieci i dorosłych, już od 1. dnia życia. Zapobiega objawom atopowego zapalenia skóry (AZS) takim jak: suchość skóry, podrażnienia, zaczerwienienia oraz objawom towarzyszącym reakcjom alergicznym. Wyjątkowo łagodna

receptura nie wywołuje podrażnień oraz szczypania oczu.

Sposób użycia

- **NOWORODKI:** zaleca się stosować 1 dozę pianki [jedno naciśnięcie pompki] na główkę dziecka oraz 2 dozy na ciało. Delikatnie rozprowadzić po zwilżonej skórze, umyć, a następnie dokładnie spłukać czystą wodą.
- **NIEMOWLĘTA, DZIECI I DOROŚLI:** nanieść kilka doz pianki na skórę ciała, twarzy lub na skórę głowy i mokre włosy, następnie rozprowadzając umyć całą powierzchnię. Dokładnie spłukać czystą wodą.
- Wyrób przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego.

Zawartość opakowania

200 ml

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Unikać przedostania się preparatu do worka spojówkowego. W razie zaistniałego kontaktu z workiem spojówkowym natychmiast przemyć oczy ciepłą wodą.
- Nie stosować na rany i błony śluzowe.
- Nie połykać. Wyrób nie powinien być stosowany przez osoby uczulone na którykolwiek ze składników.
- W przypadku wystąpienia podrażnienia należy zaprzestać stosowania wyrobu.
- W sytuacji zaostżenia zmian skórnych skontaktować się z lekarzem.
- Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią przed zastosowaniem powinny skonsultować się z lekarzem.