

Entitis Baby smak truskawkowy, dla dzieci powyżej 6 miesiąca życia 30 saszetek zmniejsza ryzyko infekcji ucha, nosa i gardła

ENTitis Baby proszek o smaku truskawkowym – 30saszetek

ENTitis baby zawiera specyficzny szczep *Streptococcus salivarius* K12, który został wyizolowany z jamy ustnej dziecka oraz witaminę D, która przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.

ENTitis to jedyny w Polsce preparat doustny, który zawiera opatentowany szczep *S. salivarius* K12, kolonizujący jamę ustną i nosogardło. Odkrycie szczepu K12 jest wynikiem ponad 30 lat badań naukowych 1-4.

Szczep *S. salivarius* K12 posiada certyfikat bezpieczeństwa GRAS (Generally Recognized As Safe) nadany przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków.

ENTitis baby polecany jest dla wszystkich niemowląt od 6. miesiąca życia oraz dzieci, w szczególności:

- dla dzieci przebywających w dużych grupach (np. żłobek, przedszkole),
 - dla dzieci ze zwiększoną tendencją do odczuwania dyskomfortu ze strony ucha, nosa, gardła, w celu uzupełnienia mikroflory górnych dróg oddechowych,
 - dla dzieci po antybiotykoterapii,
 - w celu wsparcia organizmu w okresie jesienno-zimowym,
- Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są ważne dla zachowania zdrowia.

Zawartość saszetki Entitis baby należy przyjąć przed pójściem spać po umyciu zębów, aby szczep mógł skutecznie skolonizować jamę ustną i nosogardło przez noc.

Entitis baby należy podawać dziecku przez około 5 minut, aby

zmaksymalizować kontakt preparatu z błoną śluzową jamy ustnej dziecka.

Można do tego użyć smoczka dla niemowląt.

Otworzyć saszetkę i wlać jej zawartość do czystej szklanki.

Zanurz wilgotny smoczek w proszku.

Umieść smoczek z proszkiem w buzi dziecka i odczekaj około 30 sekund, aż proszek się rozpuści.

Powtarzaj czynność, aż podasz dziecku całą porcję z saszetki.

ENTitis baby można również podawać w postaci zawiesiny doustnej przy użyciu specjalnego smoczka do podawania preparatów.

W przypadku dzieci, które nie używają smoczka, zawartość saszetki można rozpuścić w niewielkiej ilości wody i podawać łyżeczką w małych porcjach przez około 5 minut.

Nie pić bezpośrednio po spożyciu.

Zalecana dzienna porcja:

1 saszetka dziennie przez minimum 3 miesiące.