

ENTitis smak truskawkowy 30 pastylek do ssania

Opis

ENTitis o smaku truskawkowym to suplement diety przeznaczony jest dla dzieci od 3. roku życia i osób dorosłych. Produkt zawiera szczep bakterii *Streptococcus salivarius* K12 oraz witaminę D. Składniki produktu wspierają odporność organizmu.i pastylek do ssania o smaku truskawkowym.

Składniki

Substancja wypełniająca: izomalt; *Streptococcus salivarius* K12 (mleko); substancja przeciwbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; aromat; cholekalcyferol (witamina D).

Składniki	1 pastylka	% RWS*
Witamina D	5 µg (200 j.m.)	100%
<i>Streptococcus salivarius</i> K12	1×10^9 (1mld) CFU**	—

*% RWS – Referencyjna Wartość Spożycia.

**CFU – jednostka tworząca kolonię.

Właściwości składników

Witamina D:

- wspiera prawidłowe funkcjonowanie mięśni,
- wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego,
- wspiera zdrowie kości i zębów,
- wspiera prawidłowe wchłanianie/wykorzystywanie wapnia/fosforu.

Zalecane dzienne spożycie

Dorośli i dzieci powyżej 3. roku życia: Stosować 1 pastylkę dziennie, najlepiej wieczorem, po umyciu zębów, aby podczas snu bakterie mogły efektywnie zasiedlać jamę ustną oraz obszar nosowo-gardłowy.

Pastylkę powinno się powoli ssać przez około 5 minut, aż całkowicie się rozpuści. Nie należy jej gryźć ani połykać, ponieważ skraca to czas kontaktu substancji czynnej ze śluzówką. Po zastosowaniu nie powinno się nic pić, aby nie osłabić działania preparatu.

Stosuj przez co najmniej trzy miesiące

Masa netto

30 g

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

- Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
- Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
- Suplement diety jest środkiem spożywczym, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety. Suplement diety nie ma właściwości leczniczych.
- Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej, chronić przed światłem.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
- Nie należy stosować przy stwierdzeniu nadwrażliwości na jakikolwiek składnik produktu.

- Przed zastosowaniem wskazane jest wykonanie badania 25-(OH)D we krwi oraz konsultacja wyniku badania z lekarzem lub farmaceutą.