

Espumisan 100mg Krople doustne antykolkowe wzdęcia na ból brzucha – 30ml



Espumisan 100 mg Krople Doustne Antykolkowe Wzdęcia Bólu Brzucha 30 ml

ESPUMISAN 100mg/ml

KROPLE ANTYKOLKOWE DLA DZIECI

30ml

Co to jest Espumisan i w jakim celu się go stosuje:

Espumisan krople doustne to lek przeznaczony do leczenia zaburzeń żołądkowo-jelitowych związanych z gromadzeniem się nadmiaru gazów w przewodzie pokarmowym. Preparat może być również stosowany jako pomoc w kolce jelitowej niemowląt oraz do przygotowania pacjentów do brzusznych badań diagnostycznych.

Zwiększone tworzenie i gromadzenie się gazów lub jelit w postaci piany bąbelkowej w handlu detalicznym prowadzi do objawów takich jak wzdęcia i uczucie pełności w jamie brzusznej.

To jest przyczyna kolki u niemowląt, które są częstymi dolegliwościami spotykanymi u około 1/3 niemowląt.

Kolka zaczyna się kilka dni po urodzeniu i trwa do około trzeciego miesiąca.

Można go znaleźć zarówno u niemowląt, jak i karmionych mieszką.

Kolka zwykle zaczyna się o tej samej porze dnia, często po południu i wieczorem, z nagle silnym krzykiem.

Twarz dziecka czerwienieje, nogi kurczą się do brzucha, a ręce są zaciśnięte w pięści.

Dziecko jest rozdrażnione, podekscytowane, niespokojne.

Espumisan zmniejsza napięcie powierzchniowe pęcherzyków gazu i pękanie małych pęcherzyków piany.

Uwolnione w ten sposób gazy mogą zostać wchłonięte przez ścianę jelita i uwolnione w sposób naturalny.

Espumisan działa w sposób fizyczny, nie zmienia reakcji chemicznych i jest nieaktywny farmakologicznie i fizjologicznie, nie wchodzi w interakcje z mikroorganizmami i enzymami.

Espumisan nie wpływa na trawienie i nie zmienia kwasowości w żołądku.

Espumisan stosuje się, gdy:

Wszystkim schorzeniom, któremu towarzyszy wzmożone tworzenie i gromadzenie się gazów w przewodzie pokarmowym (wzdęcia), którym towarzyszą objawy takie jak dyskomfort, obrzęk, uczucie ciężkości i pełności w jamie brzusznej; kolka u niemowląt; nadmierne spożycie powietrza, jak w przypadku spożycia żywności i napojów, prowadzące do zwiększonego tworzenia się gazów (fasola, kapusta, napoje gazowane); dolegliwości serca w wyniku ruchu przepony w górę z powodu gromadzenia się gazu w przewodzie pokarmowym; przygotowanie jamy brzusznej do obrazowania (RTG, USG itp.) oraz jako dodatek do środka kontrastowego w radiografii dwukontrastowej; zatrucie detergentami (tenzydy).

Przed użyciem Espumisan:

Espumisan nie powinien być stosowany u pacjentów z nadwrażliwością na składnik czynny simetikon lub jakikolwiek inny składnik leku.

Stosowanie innych leków

Nie są znane reakcje między tym produktem a innymi.

Ciąża i karmienie

Nie ma powodu, aby unikać stosowania Espumisan podczas ciąży i

karmienia piersią.

Prowadzenie i użytkowanie maszyn

Espumisan® L nie zmienia czasu reakcji i nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Jak przyjmować Espumisan:

Niemowlęta:

1ml. (odpowiednik 5-10 kropli) Espumisan dodaje się do butelki mleka podczas każdego posiłku lub małą łyżeczką przed lub po każdym karmieniu.

Dzieci w wieku 1-6 lat:

1ml (co odpowiada 10 kroplom) Espumisan, 3-5 razy dziennie.

Dzieci w wieku 6-14 lat:

1-2ml. (odpowiednik 10-20 kropli) Espumisan, 3-5 razy dziennie.

Nastolatki i dorośli:

2ml. (odpowiednik 20 kropli) Espumisan, 3-5 razy dziennie.

Espumisan przyjmuje się w trakcie lub po posiłku lub, jeśli to konieczne, przed snem.

Czas trwania leczenia zależy od postępu skarg.

W razie potrzeby Espumisan można przyjmować przez długi czas.

Do przygotowania obrazowania jamy brzusznej

2ml. (odpowiednik 50 kropli) Espumisan, 3 dzień przed obrazowaniem i 2ml. Espumisan, rano w dniu obrazowania, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Oprócz środków kontrastowych w obrazowaniu

4-8 ml. (odpowiednik 100-200 kropli) Espumisan do 1l kontrastu do radiografii z podwójnym kontrastem.

Jako antidotum na zatrucie detergentami

Dawkowanie zależy od ciężkości zatrucia:

Dzieci: 2,5-10ml. (65 kropli do 1/3 butelki) Espumisan

Dorośli: 10-20ml. (1/3 do 2/3 butelki) Espumisan.

Proszę zanotować:

Przed użyciem dobrze wstrząśnij butelką. Aby dozować, trzymaj butelkę do góry nogami.

Espumisan można stosować po operacjach.

Espumisan nie zawiera cukru, dlatego jest odpowiedni dla diabetyków i osób z niestrawnością.

Jeśli przedawkowałeś Espumisan

Nie można się otruć, jeśli przedawkuje się Espumisan, więc nie ma powodów do obaw.

Możliwe efekty uboczne

Nie są znane reakcje pomiędzy Espumisanem a innymi produktami.

Jak przechowywać Espumisan

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Mieć się w miejscu, poza zasięgiem wzroku dzieci!

Substancją czynną jest: symetykon.

1 ml (25 kropli) emulsji zawiera 40 mg. simetikon jako dimetikon – dwutlenek krzemu 96:4; symetykon (dimetikon-ditlenek krzemu 96:4; symetykon).

Pozostałe składniki to:

monostearynian glikolu polietylenowego 1500, monostearynian glicerolu, kwas sorbinowy, hydroksypropyloceluloza, cyklaminian sodu, sól sodowa sacharyny, aromat bananowy, woda oczyszczona.

Pojemność: 30 ml