

Femaltiker Plus o smaku czekoladowym 12 saszetek

Femaltiker plus choco 12 sasz..czekolada

Femaltiker Plus to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w problemach z laktacją. Może być stosowany u kobiet karmiących piersią w przypadku rzeczywistego niedoboru pokarmu lub problemów z wywołaniem, lub utrzymaniem laktacji. Formuła preparatu została wzbogacona o cholinę oraz składniki odżywcze takie jak: foliany (kwas foliowy i L-metylofolian wapnia – FolActiv). Zawiera również witaminy B6 i B12, które odżywiają organizm kobiety. Składniki produktu w większości przechodzą do mleka kobiecego, wpływając na jego jakość i wartość odżywczą. Słód jęczmienny zawarty w Femaltiker Plus został krótko składowany, aby zwiększyć biodostępność zawartych w nim białek i węglowodanów, co ułatwia oddziaływanie beta-glukanu na organizm kobiety. Proces przygotowania słodu jęczmiennego i jego specjalna formuła pozwala na otrzymanie słodu o jak największej zawartości składników odżywczych.

Femaltiker Plus o smaku czekoladowym zalecany jest jako uzupełnienie schematu profesjonalnej porady doradcy laktacyjnego, do specjalnego odżywiania dla kobiet w okresie laktacji, zwłaszcza na początkowym jej etapie oraz w problemach związanych z jej utrzymaniem. Stosowanie produktu zalecane jest od drugiej doby po porodzie. Produkt należy przyjmować pod nadzorem lekarza. Femaltiker Plus to żywność niekompletna pod względem odżywczym, która nie może być stosowana jako wyłączne źródło pożywienia.

Zastosowanie

Do postępowania dietetycznego u kobiet karmiących piersią w przypadku:

rzeczywistego niedoboru pokarmu

problemów z wywołaniem lub utrzymaniem laktacji

niskiego przyrostu wagowego dziecka związanego z niedostateczną ilością pokarmu i / lub jego zbyt niską wartością odżywczą spowodowaną złym stanem odżywienia kobiety karmiącej.

Zalecane spożycie

Spożywać zgodnie z zalecanym przez lekarza/specjalistę laktacyjnego lub zgodnie ze schematem:

1-2 porcje dziennie w trakcie posiłku.

Ze względu na mechanizm działania zaleca się spożyć Femaltiker Plus na 30 minut do 1 godziny przed planowanym karmieniem lub odciąganiem pokarmu.

Rozpoczęcie stosowania preparatu zalecane jest od drugiej doby po porodzie.

Application