

Femaltiker Plus o smaku karmelowym 12 saszetek

Ważne wskazówki

Zawartość netto

Producent

Opis produktu

Femaltiker Plus o smaku karmelowym to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego u kobiet karmiących piersią w przypadku:

rzeczywistych niedoborów pokarmu,
problemów z wywołaniem lub utrzymaniem laktacji,
niskiego przyrostu wagowego niemowlęcia związanego z niedostateczną ilością pokarmu i/ lub jego zbyt niską wartością odżywczą spowodowaną złym stanem odżywienia kobiety karmiącej.

Preparat przeznaczony jest w szczególności do stosowania w początkowym etapie laktacji oraz w przypadku pojawienia się problemów z jej utrzymaniem i pozwala na dostarczenie specjalnych składników odżywczych, pozwalających na właściwe odżywienie organizmu kobiety karmiącej piersią. Produkt zawiera krótko słodowany słód jęczmienny, będący źródłem białka i węglowodanów. Jego specjalna formuła i odpowiedni proces technologiczny przygotowania pozwala na otrzymanie słodu jęczmiennego o lepszej przyswajalności i dostępności, a także bogatszym składzie odżywczym. Słód jęczmienny został włączony do protokołu postępowania dietetycznego w stymulacji laktacji w przypadku stwierdzonego przez specjalistę rzeczywistego niedoboru pokarmu u matki. Formuła Femaltiker Plus została dodatkowo wzbogacona o cholinę oraz foliany (w postaci kwasu foliowego i L-metylofolianu wapnia FolActiv),

witaminy B6 i B12.

Femaltiker Plus to żywność niekompletna pod względem odżywczym, która nie może być stosowana jako wyłącznie źródło pożywienia.

Zastosowanie

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w problemach z laktacją.

Zalecane spożycie

Kobiety w okresie laktacji: 1-2 saszetki dziennie w trakcie posiłku o ile lekarz lub specjalista laktacyjny nie zaleci inaczej.

Sposób użycia

Ze względu na mechanizm działania zaleca się spożywanie produktu 30 minut do 1 godziny przed planowanym karmieniem lub odciąganiem pokarmu.

Przed rozpoczęciem przygotowywania roztworu należy umyć ręce oraz naczynia, które mają zostać użyte.

Zawartość saszetki rozpuścić w ok. 150 ml chłodnego lub ciepłego mleka i dokładnie wymieszać do całkowitego rozpuszczenia.

W przypadku alergii lub nietolerancji mleka krowiego roztwór może zostać przygotowany na bazie napojów roślinnych np. jęczmiennego, sojowego, ryżowego, owsianego, orkiszowego lub ewentualnie wody.

Preparat można również wymieszać z jogurtem naturalnym lub smakowym.

Zaleca się rozpoczęcie stosowania preparatu od drugiej doby po porodzie.

Składniki

Formuła Femaltiker (słód jęczmienny, beta-glukan z jęczmienia, suchy wyciąg z melisy (*Melissa officinalis*), aromat naturalny: karmel, dwuwinian choliny, chlorowodorek pirydoksyny, L-

metylofolian wapnia, kwas pteroilomonoglutaminowy, cyjanokobalamina.

100 g produktu zawiera:

wartość energetyczna 1637 kJ/ 385 kcal,
tłuszcz 0,1 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,1 g;
węglowodany 93 g, w tym cukry 56 g; błonnik 1,5 g; białko 3 g;
sól 0 g,
witamina B6 37,3 mg; foliany FolActiv 3 mg; witamina B 12 41,8 µg,
cholina 1,5 g, słód jęczmienny 71,6 g, beta-glukan z jęczmienia min, 4,5 g, suchy wyciąg z melisy 1,2 g.

1 saszetka zawiera:

wartość energetyczna 126 kJ/ 30 kcal,
tłuszcz 0 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0 g; węglowodany 7 g, w tym cukry 4,3 g; błonnik 0,1 g; białko 0,2 g; sól 0 g,
witamina B6 2,5 mg; foliany FolActiv 200 µg; witamina B 12 2,8 µg,
cholina 100 mg, słód jęczmienny 4,8 g, beta-glukan z jęczmienia min. 300 mg, suchy wyciąg z melisy 80 mg.

2 saszetki zawierają:

wartość energetyczna 252 kJ/ 59 kcal,
tłuszcz 0 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0 g; węglowodany 14 g, w tym cukry 8,6 g; błonnik 0,2 g; białko 0,5 g; sól 0 g,
witamina B6 5 mg; foliany FolActiv 400 µg; witamina B 12 5,6 µg,
cholina 200 mg, słód jęczmienny 9,6 g, beta-glukan z jęczmienia min. 600 mg, suchy wyciąg z melisy 160 mg.

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Produkt zawiera zboża będące źródłem glutenu (ze słodu jęczmiennego).

Ważne wskazówki

Przed rozpoczęciem stosowania preparatu należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi zalecanego spożycia i spo Produkt należy stosować pod nadzorem lekarza.

Preparat nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

Produkt nie może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia.

Nie stosować u osób, u których nie stwierdzono problemów z laktacją lub brak jest wskazań lekarskich do jego stosowania.sobu użycia zamieszczonymi na opakowaniu oraz w ulotce.

Lekarz może zalecić okres przyjmowania oraz porcję preparatu indywidualnie dopasowane do potrzeb dietetycznych.

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej 15-25°C, w sposób niedostępny i niewidoczny dla małych dzieci.