

Glimbax – 200ml

Glimbax 200ml/14roku

Opis produktu

Glimbax to lek w postaci roztworu do płukania jamy ustnej i gardła. Substancją czynną preparatu jest diklofenak zaliczany do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Składnik ten stosowany na błony śluzowe jamy ustnej wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne.

Wskazaniem do stosowania płynu do płukania gardła i jamy ustnej Glimbax jest objawowe leczenie stanów zapalnych błony śluzowej jamy ustnej i gardła, w tym związanych z zapaleniem dziąseł, jak również w stanach po zabiegach stomatologicznych oraz w przypadku objawów podrażnienia mechanicznego m.in. spowodowanych noszeniem aparatu ortodontycznego. Preparat przeznaczony jest do stosowania u osób dorosłych oraz dzieci powyżej 14 roku życia.

Wskazania

Leczenie objawowe stanów zapalnych błony śluzowej jamy ustnej i gardła.

Skład

1 ml roztworu zawiera:

- substancję czynną: diklofenak w postaci kwasu 0,74 mg,
- substancje pomocnicze: cholina roztwór 50%, sorbitol, sodu benzoatan, disodu edetynian, acesulfam potasowy, substancja poprawiająca smak i zapach-brzoskwiniowa, substancja poprawiająca smak i zapach-miętowa, czerwien koszenilowa (E 12)

Dawkowanie

- *Dorośli i dzieci powyżej 14 roku życia:* zaleca się stosowanie roztworu do płukania jamy ustnej i gardła 2-3

razy na dobę.

- Każdorazowo należy użyć 15 ml roztworu (1 miarkę) nierozcieńczonego lub rozcieńczonego niewielką ilością wody i płukać jamę ustną przez około 30-60 sekund.
- Po użyciu roztwór należy wypłuć.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach stosowania leku Glimbax, należy skontaktować się z lekarzem. Przeciwwskazania

- Uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną (diklofenak) lub którykolwiek z pozostałych składników leku.
- Nie stosować:
 - u dzieci w
 - Uczulenie (nadwrażliwość) na kwas acetylosalicylowy lub na inny lek z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (np. po podaniu ibuprofenu, ketoprofenu, aspiryny wystąpił napad astmy, pokrzywka lub kataralergiczny).
 - wieku poniżej 14 lat,
- u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Przechowywanie

Przechowywać w sposób niewidoczny i niedostępny dla dzieci.

Działania niepożądane Jak każdy lek, Glimbax może powodować działania niepożądane.

Podczas stosowania leku (zwłaszcza długotrwałego) mogą wystąpić objawy podrażnienia błony śluzowej jamy ustnej (np. pieczenie) i kaszel.

Może również dojść do rozwoju reakcji nadwrażliwości.

W takim przypadku należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem, który zaleci odpowiednie leczenie.

Nie można wykluczyć możliwości wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych w przypadku połącznienia lub długotrwałego stosowania leku Glimbax.