Hexatiab Active żel dopochwowy 25 ml

Opis

Hexatiab Active Żel to wyrób medyczny stosowany w celu wspomagania regeneracji tkanki. Preparat aplikowany jest na skórę, gdzie działa miejscowo. Zaleca się stosowanie go w przypadku podrażnień lub uszkodzeń naskórka. Opinie użytkowników mogą różnić się w zależności od indywidualnych doświadczeń. W celu uzyskania najlepszych efektów, należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotce dołączonej do opakowania. Przed użyciem warto zapoznać się z wszystkimi instrukcjami i informacjami.

Składniki

INCI: woda, alkohol cetearylowy, stearynian gliceryny, żywica silikonowa (C24-28 Alkyldimethylsiloxy Trimethylsiloxysilicate), izododekan, kopolimer akrylowo-amidowy (Polyacrylate-13), glukozyd cetearylowy (Cetearyl Glucoside), Fomblin® (Polyperuoromethylisopropyl Ether), poliizobuten, kwas hialuronowy, witamina E (Tocopherol), Polysorbate 20, izostearynian sorbitanu, kwas mlekowy, srebro aXonnite MED, miedź aXonnite MED.

Przeznaczenie produktu

Hexatiab Active żel to wyrób medyczny przeznaczony do leczenia zmian okolic intymnych o charakterze: bakteryjnym; grzybiczym; wirusowym. Ponadto przynosi ulgę przy podrażnieniach, pieczeniu oraz świądzie stref intymnych zarówno żeńskich jak i męskich.

Sposób użycia wyrobu medycznego

Przed użyciem umyć i dokładnie osuszyć miejsce aplikacji. Nanieść cienką warstwę wyroby na miejsce zmienione chorobowo. Nie wmasowywać. Pozostawić do wyschnięcia. Stosować raz dziennie przez okres siedmiu dni lub do ustąpienia objawów chorobowych.

Zawartość opakowania

25 ml

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeżeli dolegliwości nie ustępują po 7 dniach należy skonsultować się z lekarzem.
- Nie należy stosować produktu po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
- Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci. Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować u osób uczulonych na którykolwiek składnik produktu.
- Kobiety w ciąży lub karmiące piersią przed zastosowaniem powinny skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.