

Iberogast płyn doustny 20 ml

IBEROGAST 20ml BÓL ŻOŁĄDKOWY BÓL BRZUCHOWY WZDĘTY ZGADZENIA
Wskazania

Przeznaczony do leczenia zaburzeń czynnościowych związanych z motoryką przewodu pokarmowego, takich jak podrażnienia żołądka, problemy trawienne, zespół jelita drażliwego (IBS) (w tym skurcze brzucha i jelit).

Skład 100 ml płynu zawiera:

15 ml ekstraktu z ziela opatrunku gorzkiego (1:1,5-2,5; ekstrahent – etanol 50% v/v), 10 ml ekstraktu z korzenia arcydzięgla (1:2,5-3,5; ekstrahent – etanol 30% v/v), 20 ml ekstrakt z kwiatu rumianku (1:2-4; ekstrahent – etanol 30% v/v), 10 ml ekstraktu z owoców kminku (1:2,5-3,5; ekstrahent – etanol 30% v/v, 10 ml ekstraktu z owoców ostropestu plamistego (1:2,5-3,5; ekstrahent – etanol 30% v/v), 10 ml ekstraktu z liści melisy (1:2,5-3,5; ekstrahent – etanol 30% v/v), 5 ml ekstraktu z liści mięty pieprzowej (1:2,5 -3,5; ekstrahent – etanol 30% v/v), 10 ml ekstraktu z ziela glistnika (1:2,5-3,5; ekstrahent – etanol 30% v/v), 10 ml ekstraktu z korzenia lukrecji (1:2,5-3,5; ekstrahent – etanol 30% v/v). Iberogast zawiera 29,5-32,6% (v/v) v) etanolu.

Akcja

Działa przeciwzapalnie, wiatropędnie, przeciwutleniająco i przeciwbakteryjnie, zmniejsza uczucie sytości, osłabia skurcze żołądka i jelit oraz hamuje wydzielanie soku żołądkowego.

Dawkowanie

O ile lekarz nie zaleci inaczej, Iberogast przyjmuje się 3 razy dziennie w niewielkiej ilości płynu przed posiłkiem lub podczas posiłku.

Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia: 20 kropli.

Dzieci od 6 do 12 lat: 15 kropli.

Jeżeli objawy utrzymują się po 2 tygodniach stosowania leku, skonsultuj się z lekarzem w sprawie ich przyczyny.

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu. Dzieci poniżej 6 roku życia. Informacje dodatkowe Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub

farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany stanowi zagrożenie dla Twojego życia lub zdrowia.