

Iberogast płyn doustny 50 ml

Iberogast płyn doustny – 50ml

Wskazania: przeznaczony do leczenia zaburzeń czynnościowych związanych z motoryką przewodu pokarmowego, takich jak podrażnienia żołądka, problemy trawienne, czy zespół jelita drażliwego (IBS) (włączając w to dolegliwości skurczowe jamy brzusznej i jelit).

Skład: 100ml płynu zawiera: 15 ml wyciągu z ziela ubiorka gorzkiego (1:1,5-2,5; ekstrahent – etanol 50% v/v), 10ml wyciągu z korzenia arcydzięgla (1:2,5-3,5; ekstrahent – etanol 30% v/v), 20ml wyciągu z kwiatów rumianku (1:2-4; ekstrahent – etanol 30% v/v), 10ml wyciągu z owoców kminku (1:2,5-3,5; ekstrahent – etanol 30% v/v), 10ml wyciągu z owoców ostropestu plamistego (1:2,5-3,5; ekstrahent – etanol 30% v/v), 10ml wyciągu z liści melisy (1:2,5-3,5; ekstrahent – etanol 30% v/v), 5ml wyciągu z liści mięty pieprzowej (1:2,5-3,5; ekstrahent – etanol 30% v/v), 10ml wyciągu z ziela glistnika (1:2,5-3,5; ekstrahent – etanol 30% v/v), 10ml wyciągu z korzenia lukrecji (1:2,5-3,5; ekstrahent – etanol 30% v/v). Iberogast zawiera 29,5-32,6% (v/v) etanolu.

Działanie: przeciwzapalne, wiatropędne, przeciwutleniające i przeciwbakteryjne, zmniejsza uczucie pełności, osłabia skurcze żołądka i jelit, hamuje wydzielanie soku żołądkowego.

Dawkowanie: jeśli lekarz nie zaleci inaczej, Iberogast przyjmuje się 3 razy dziennie w małej ilości płynu przed lub w czasie posiłków. Dorosli i młodzież powyżej 12 lat: 20 kropli.

Dzieci od 6 do 12 lat: 15 kropli. W przypadku nie ustępowania dolegliwości po 2 tygodniach stosowania leku, należy zasięgnąć porady lekarza na temat ich przyczyny.

Przeciwwskazania: nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu. Dzieci poniżej 6 lat.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

reakcje nadwrażliwości – wysypka, świąd, duszności.

odwracalne uszkodzenie wątroby (ze względu na obecność glistnika).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Stosowanie leku omówić z lekarzem w przypadku stwierdzonych chorób wątroby.

Lek zawiera alkohol i nie powinien być stosowany w przypadku choroby alkoholowej.

Stosowanie leku w przypadku dzieci z padaczką i chorobami wątroby powinno być omówione z lekarzem.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 8 tygodni.

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Ciaża i karmienie piersią

W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Nie należy stosować leku u dzieci poniżej 6 lat.