

Ibuvit D3 2000 IU – 60kapsułek

Ibuvit D3 2000 IU – 60 kapsułek

Opis produktu

Ibuvit D3 2000 IU to lek w postaci kapsułek, zawierający cholekalcyferol – substancję czynną. Cholekalcyferol jest identyczny z witaminą D, która jest wytwarzana w organizmie człowieka. Witamina D działa poprzez zwiększenie przyswajania wapnia z jelit i minimalizowanie jego wydalania przez nerki, dzięki czemu wspomaga budowę kości.

Wskazania

Lek Ibuvit D3 2000 IU jest stosowany:

w profilaktyce stanów związanych z niedoborem witaminy D u dorosłych z prawidłową masą ciała oraz dzieci i młodzieży z prawidłową masą ciała w wieku 11 lat i powyżej,

wspomagająco w leczeniu osteoporozy u dorosłych,

zapobiegawczo w powstawaniu niedoborów witaminy D u kobiet planujących ciążę, w ciąży i karmiących piersią, w porozumieniu z lekarzem.

Skład

1 kapsułka zawiera:

substancja czynna: cholekalcyferol 50 µg, równoważny 2000 IU witaminy D,

pozostałe składniki to: zawartość kapsułki: olej krokoszowy oczyszczony, skład otoczki kapsułki: żelatyna, glicerol, woda oczyszczona, triglicerydy kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha.

Działanie

Zapobieganie powstawaniu niedoborów witaminy D3.

Dawkowanie

Dorośli oraz dzieci i młodzieży w wieku 11 lat i powyżej: 2000 IU (1 kapsułka) na dobę u pacjentów z prawidłową masą ciała, w miesiącach od października do kwietnia lub przez cały rok, jeśli nie jest zapewniona efektywna synteza skórna witaminy D w miesiącach letnich.

Dorośli wspomagająco w leczeniu osteoporozy: 1 kapsułka na dobę, niezależnie od pory roku.

Kobiety planujące ciążę, w ciąży i karmiących piersią, w porozumieniu z lekarzem: zalecana dawka to 2000 IU (1 kapsułka) na dobę, niezależnie od pory roku, chyba że lekarz zaleci inny sposób dawkowania.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku Ibutit D3 2000 IU jeśli pacjent ma uczulenie na cholekalcyferol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Nie należy stosować jeśli u pacjenta stwierdzono podwyższone stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia) lub w moczu (hiperkalciuria).

Nie stosować leku gdy pacjent ma ciężką niewydolność nerek,

kamienie w nerkach (kamica nerkowa) lub ma skłonność do powstawania kamieni w nerkach.

Nie przyjmować Ibuvit D3 2000 IU jeśli u pacjenta stwierdzono podwyższone stężenie witaminy D we krwi (hiperwitaminoza witaminy D).

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 11 lat.

Przechowywanie

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Niektóre działania niepożądane mogą być poważne i wymagać natychmiastowej pomocy lekarskiej. Należy natychmiast zgłosić się do lekarza, jeśli wystąpią objawy obrzęku naczynioruchowego, takie jak obrzęk twarzy, języka lub gardła (krtani), trudności w połykaniu, pokrzywka i trudności w oddychaniu.

Niezbyt często (występują u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

podwyższone stężenie wapnia we krwi,

podwyższone stężenie wapnia w moczu.

Rzadko (występują u mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

wysypka,

świad,

pokrzywka.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

zaparcia,

gazy,

nudności,

ból brzucha,

biegunka.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie, lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Leki działające na serce lub nerki, takie jak glikozydy nasercowe, lub leki moczopędne z grupy tiazydów (np. bendroflumetiazyd). Jednoczesne stosowanie z witaminą D może powodować znaczny wzrost stężenia wapnia we krwi i w moczu.

Leki zawierające witaminę D, kalcytriol lub inne metabolity i analogi witaminy D, a także pokarmy bogate w witaminę D.

Aktynomycynę (lek stosowany w leczeniu pewnych postaci raka) i imidazolowe leki przeciwgrzybicze, leki stosowane w leczeniu grzybicy.

Leki przeciwpadaczkowe (przeciwdrgawkowe).

Barbiturany (leki nasenne, przeciwpadaczkowe).

Glikokortykosteroidy.

Leki obniżające stężenie cholesterolu we krwi (takie jak kolestyramina lub kolestypol).

Niektóre leki stosowane w leczeniu otyłości, zmniejszające wchłanianie tłuszczów.

Niektóre leki przeczyszczające.

Leki stosowane w hiperkalcemii (podwyższone stężenia wapnia we krwi), takie jak kalcytonina, etidronian, pamidronian.

Leki zobojętniające zawierające magnez lub glin (stosowane na zgagę i niestrawność).

Leki stosowane w leczeniu gruźlicy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W okresie dużej ekspozycji na światło słoneczne w miesiącach letnich (od maja do września) zaleca się okresowe wstrzymanie się od przyjmowania witaminy D.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ibuvit D3 2000 IU należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

jeśli pacjent przyjmuje niektóre leki stosowane w chorobach serca,

jeśli pacjent ma sarkoidozę (choroba układu odpornościowego, która może zwiększać stężenie witaminy D w organizmie),

jeśli pacjent stosuje inne leki zawierające witaminę D lub spożywa pokarmy bogate w witaminę D, ponieważ dodatkowe dawki witaminy D można przyjmować tylko pod nadzorem lekarza,

jeśli pacjent przyjmuje dodatkowe dawki wapnia,

jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że pacjent będzie narażony na dużą ilość promieniowania słonecznego w czasie stosowania leku Ibuvit D3 2000 IU,

jeśli pacjent ma uszkodzone lub chore nerki,

jeśli leczenie witaminą D jest długotrwałe, gdyż w takim przypadku lekarz powinien kontrolować u pacjenta stężenie wapnia w surowicy i w moczu oraz sprawdzać czynność nerek, oznaczając stężenie kreatyniny we krwi.

Podmiot odpowiedzialny

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.