

Ibuvit D3 4000 IU – 30kapsułek

Ibuvit D3 4000 IU – 30 kapsułek

Opis produktu

Lek Ibuvit D3 4000 IU zawiera w swoim składzie substancję czynną cholekalcyferol, która jest identyczna z witaminą D, która jest wytwarzana w organizmie człowieka. Witamina D działa na zwiększenie wchłaniania wapnia z jelit oraz zmniejsza jego wydalanie przez nerki, wspomagając budowę kości.

Wskazania

Lek Ibuvit D3 4000 IU jest stosowany:

w profilaktyce niedoboru witaminy D,

u osób z otyłością w stanach wynikających z niedoboru witaminy D.

Skład

1 kapsułka zawiera:

substancja czynna: cholekalcyferol 100 mikrogramów, równoważne 4000 IU witaminy D,

pozostałe składniki to: zawartość kapsułki: olej krokoszowy oczyszczony, skład otoczki kapsułki: żelatyna, glicerol, woda

oczyszczona, triglicerydy kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha.

Działanie

Zapobieganie niedoborom witaminy D3.

Dawkowanie

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Dorośli: 1 kapsułka na dobę, w miesiącach od października do kwietnia lub przez cały rok, jeśli nie jest zapewniona efektywna synteza skórna witaminy D w miesiącach letnich.

Kapsułkę należy połknąć w całości, popijając wodą, najlepiej podczas głównego posiłku.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować Ibutit D3 4000 IU jeśli pacjent ma uczulenie na cholekalcyferol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Nie należy stosować gdy u pacjenta stwierdzono podwyższone stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia) lub w moczu (hiperkalciuria).

Nie stosować leku jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek, kamienie w nerkach (kamica nerkowa) lub ma skłonność do powstawania kamieni w nerkach.

Nie należy stosować tego leku jeśli u pacjenta stwierdzono podwyższone stężenie witaminy D we krwi (hiperwitaminoza

witaminy D).

Nie stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat oraz u pacjentek w ciąży.

Przechowywanie

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Należy natychmiast zgłosić się do lekarza, jeśli wystąpią objawy obrzęku naczynioruchowego, takie jak obrzęk twarzy, języka lub gardła, trudności w połykaniu, pokrzywka i trudności w oddychaniu.

Niezbyt często (występują u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

podwyższone stężenie wapnia we krwi,

podwyższone stężenie wapnia w moczu.

Rzadko (występują u mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

wysypka,
świąd,
pokrzywka.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

zaparcia,
gazy,
nudności,
ból brzucha,
biegunka.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie, lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, szczególnie jeśli są to:

leki działające na serce lub nerki, takie jak glikozydy nasercowe (np. digoksyna) lub leki moczopędne z grupy tiazydów (np. bendroflumetiazyd), gdyż jednoczesne stosowanie z witaminą D może powodować znaczny wzrost stężenia wapnia we

krwi i w moczu,

leki zawierające witaminę D, kalcytriol lub inne metabolity i analogi witaminy D, a także pokarmy bogate w witaminę D,

aktynomycynę (lek stosowany w leczeniu pewnych postaci raka) i imidazolowe leki przeciwgrzybicze (np. klotrimazol i ketokonazol, leki stosowane w leczeniu grzybicy),

leki przeciwpadaczkowe (przeciwdrgawkowe),

barbiturany (leki nasenne, przeciwpadaczkowe),

leki zobojętniające zawierające magnez lub glin (stosowane na zgagę i niestrawność),

leki stosowane w hiperkalcemii (podwyższone stężenia wapnia we krwi), takie jak kalcytonina, etidronian, pamidronian,

niektóre leki przeczyszczające (takie jak olej parafinowy),

leki stosowane w leczeniu otyłości, zmniejszające wchłanianie tłuszczów (np. orlistat),

glikokortykosteroidy (hormony sterydowe, takie jak hydrokortyzon lub prednizolon),

leki obniżające stężenie cholesterolu we krwi (takie jak kolestyramina lub kolestypol),

leki stosowane w leczeniu gruźlicy (np. ryfampicyna, izoniazyd).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W okresie dużej ekspozycji na światło słoneczne w miesiącach letnich (od maja do września) zaleca się okresowe wstrzymanie się od przyjmowania witaminy D.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ibuvit D3 4000 IU należy

omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

jeśli pacjent przyjmuje niektóre leki stosowane w chorobach serca (np. glikozydy nasercowe, takie jak digoksyna),

jeśli pacjent ma sarkoidozę (choroba układu odpornościowego, która może zwiększać stężenie witaminy D w organizmie),

jeśli pacjent stosuje inne leki zawierające witaminę D lub spożywa pokarmy bogate w witaminę D, ponieważ dodatkowe dawki witaminy D można przyjmować tylko pod nadzorem lekarza,

jeśli pacjent przyjmuje dodatkowe dawki wapnia,

jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że pacjent będzie narażony na dużą ilość promieniowania słonecznego w czasie stosowania leku Ibutit D3 4000 IU,

jeśli pacjent ma uszkodzone lub chore nerki,

jeśli leczenie witaminą D jest długotrwałe, gdyż w takim przypadku lekarz powinien kontrolować u pacjenta stężenie wapnia w surowicy i w moczu oraz sprawdzać czynność nerek, oznaczając stężenie kreatyniny we krwi.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Ibutit D3 4000 IU jest przeciwwskazany u kobiet czasie

cięży oraz nie jest przeznaczony dla kobiet karmiących piersią.

Podmiot odpowiedzialny

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.