

Juvit C krople doustne z witaminą C dla dzieci od 28 dnia życia 40 ml

Opis

Juvit C to produkt leczniczy zawierający witaminę C , stosowany przy niedoborze witaminy C oraz w profilaktyce chorób spowodowanych jej niedostateczną ilością. Produkt w formie kropli doustnych, szczególnie rekomendowany dla dzieci.

Składniki

- Substancją czynną jest kwas askorbowy w ilości 100 mg w 1 ml kropli.
- Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: glicerol, woda oczyszczona.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

Zalecana dawka (o ile lekarz nie zaleci inaczej) to:

niemowlęta i małe dzieci (od 28 dnia życia do końca 24 miesiąca życia): 5-8 kropli raz na dobę dodane do pokarmu lub napoju.

dzieci (od 3 r.ż. do 11 r.ż.): 10 kropli raz na dobę.

młodzież (od 12 r.ż.) i dorośli: 15-20 kropli raz na dobę (w

razie większego zapotrzebowania i w niedoborach dawkę można podwoić i przyjmować dwa razy na dobę).

Juvit C może być dodany do pokarmu lub napoju.

1 ml odpowiada około 20 kroplom.

Z uwagi na ryzyko przedawkowania nie należy podawać bezpośrednio z butelki do ust dziecka.

Działanie

Witamina C:

- bierze udział w metabolicznych procesach utleniania i redukcji zachodzących w komórkach np. w procesie oddychania komórkowego;
- jest niezbędna do tworzenia kolagenu, elastyny i substancji międzykomórkowej, a tym samym do prawidłowego rozwoju chrząstki, kości, zębów, gojenia ran, zwiększa elastyczność naczyń włosowatych;
- wpływa na tworzenie ciał odpornościowych w organizmie (uważa się, że bierze udział w wytwarzaniu immunoglobulin i interferonu);
- ułatwia wchłanianie żelaza w jelitach;
- jest niezbędna do syntezy steroidów nadnerczy, katecholamin, insuliny;
- bierze udział w przemianie aminokwasów aromatycznych i metabolizmie tyroksyny.

Wskazania

Juvit C stosowany w leczeniu stanów niedoboru witaminy C i profilaktyki chorób wywołanych niedoborem witaminy C, przede wszystkim szkorbutu i jego wstępnych objawów, choroby Moellera-Barłowa, w okresie rekonwalescencji, przy stosowaniu diety ubogiej w witaminę C, zwłaszcza u niemowląt karmionych sztucznie. Juvit C jest szczególnie zalecany dla dzieci.

Kiedy nie stosować

- jeśli pacjent ma uczulenie na kwas askorbowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- jeśli u pacjenta występuje szczawianowa kamica nerkowa.

Nie podawać wysokich dawek osobom z nadmiernym wchłanianiem żelaza z przewodu pokarmowego.

Działania niepożądane

Juvit C może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują.

Witamina C zazwyczaj jest dobrze tolerowana. Duże dawki, zwłaszcza stosowane długotrwale, mogą niekiedy powodować bóle głowy, zaczerwienienie skóry, działać moczopędnie, a także prowadzić do odkładania się kryształów szczawianu wapnia i moczanów w drogach moczowych. Obserwowano także po odstawieniu rozwój tolerancji z objawami niedoboru po odstawieniu (szkorbut), a nawet uzależnienie, z bólami głowy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

U osób z niedoborem dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej, może powodować hemolizę krwinek czerwonych. Juvit C podawany w dużych dawkach, może wpływać na wyniki badań laboratoryjnych, zwłaszcza wykonywanych metodami oksydoredukcyjnymi (fałszywie dodatni wynik testu na obecność glukozy w moczu, fałszywie ujemny wynik testu na obecność krwi w kale, zaniżenie wyników oznaczeń aktywności niektórych enzymów). Zależnie od

zastosowanej metody może zawyżać lub zaniżać wyniki oznaczeń zawartości bilirubiny w surowicy krwi. Przed rozpoczęciem stosowania Juvit C należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Podawanie witaminy C z sulfonamidami może prowadzić do wytrącania się kryształów sulfonamidów w moczu. Witamina C:

- zwiększa wchłanianie żelaza;
- wydłuża okres półtrwania paracetamolu we krwi;
- działa synergistycznie z glikozydami flawinowymi;
- może wpływać na wzrost stężenia stosowanych jednocześnie estrogenów w surowicy krwi.

Tetracykliny, doustne środki antykoncepcyjne, barbiturany oraz duże dawki kwasu acetylosalicylowego zmniejszają stężenie kwasu askorbowego we krwi.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Niemowlętom i małym dzieciom można podawać Juvit C dodany do pokarmu lub napoju.

Prowadzenie pojazdów i maszyn

Juvit C nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.