

Lioton 1000 żel 100 g

Opis

Lioton 1000 to produkt leczniczy wskazany do stosowania w leczeniu wspomagającym:

- w chorobach żył powierzchownych takich, jak zapalenia żył, zakrzepowym zapaleniu żył, żylakach kończyn dolnych;
- w krwiniakach podskórnych, stłuczeniach, obrzękach.

Składniki

Substancja czynna: heparyna sodowa (Heparinum natricum) 1 g żelu zawiera 8,5 mg (1000 j.m.) heparyny sodowej. Pozostałe składniki: karbomer 940, propylu parahydroksybenzoesan, metylu parahydroksybenzoesan, etanol 96%, olejek lawendowy, olejek pomarańczowy, trietanolamina, woda oczyszczona.

Dawkowanie

Lioton należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, czy farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli:

Lioton 1000 przeznaczony jest do stosowania na skórę. Lioton należy stosować 1 do 3 razy na dobę nakładając pasek żelu o długości 3-10 cm na powierzchnię skóry i delikatnie masując aż do wchłonięcia żelu. W przypadku obrzęków po urazach zaleca się stosowanie lioton przez okres do 10 dni, a w przypadku leczenia chorób żył powierzchownych przez 1 do 2 tygodni.

Działanie

Główny czynny składnik żelu Lioton to heparyna wykazuje działanie miejscowe przeciwzakrzepowe, przeciwobrzękowe i przeciwzapalne.

Wskazania

Lioton 1000 stosuje się w leczeniu wspomagającym w chorobach żył powierzchownych takich jak zapalenia żył, zakrzepowym zapaleniu żył, żylakach kończyn dolnych, w krwiniakach podskórnych, stłuczeniach, obrzękach. Żel Lioton 1000 skutecznie niweluje następujące objawy chorób żył powierzchownych takich jak uczucie ciężkich nóg, zaczerwienie i obrzęki.

Kiedy nie stosować

Lioton 1000 nie należy stosować w przypadku znanej nadwrażliwości na heparynę lub którykolwiek ze składników leku (ze względu na obecność hydroksybenzoesanów metylu i propylu jako substancji pomocniczych nie należy stosować lioton u osób z alergią na parabeny) , nie należy stosować na otwarte rany lub sącące się zmiany skórne. Nie stosować w okolicy oczu, nosa i ust. Lioton 1000 nie należy stosować w przypadku krwawienia i nie wolno przyjmować doustnie.

Działania niepożądane

Lioton 1000 może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić objawy reakcji alergicznych (zaczerwienienie i świąd skóry) lub objawy reakcji pseudoalergiczných. W takich przypadkach leczenie należy przerwać. U niektórych pacjentów, u których pierwotnie występuje czerwienica prawdziwa, po podaniu miejscowym żelu mogą pojawić się zmiany skórne. Jeśli

nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Heparyna sodowa w postaci żelu jest zazwyczaj dobrze tolerowana, ale długotrwałe stosowanie może wywołać u niektórych osób skórne reakcje nadwrażliwości. W wypadku wystąpienia zaczerwienienia, wysypki lub świądu natychmiast należy przerwać stosowanie i zastosować odpowiednie leczenie. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów, u których stwierdzono skazę krwotoczną.

Lioton 1000 zawiera metylu 4-hydroksybenzoesan, propylu 4-hydroksybenzoesan, aromat pomarańczowy i olejek lawendowy: Lioton zawiera metylu 4-hydroksybenzoesan i propylu 4-hydroksybenzoesan jako substancje konserwujące. Może to powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego). Lioton zawiera aromaty, w skład których wchodzi cytral, cytronellol, kumaryna, d-limonen, farnezoł, geraniol i linalol. Cytral, cytronellol, kumaryna, d-limonen, farnezoł, geraniol i linalol mogą powodować reakcje alergiczne.

Ciąża i karmienie piersią

W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Ponieważ brak jest badań dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat, Lioton 1000 nie należy stosować w tej grupie wiekowej.

Prowadzenie pojazdów i maszyn

Lioton 1000 nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.