

Mastodynon – 60tabletek

Opis produktu

Mastodynon to niehormonalny lek homeopatyczny pochodzenia naturalnego w postaci tabletek przeznaczony dla kobiet dorosłych po 18 roku życia. Stosowany jest wspomagająco w zespole napięcia przedmiesiączkowego z takimi objawami jak: mastodynia (bolesność piersi), zaburzenia równowagi emocjonalnej, po wykluczeniu przez lekarza poważnych przyczyn dolegliwości.

Wskazania

W zespole napięcia przedmiesiączkowego z takimi objawami jak:

- bolesność piersi,
- zaburzenia równowagi emocjonalnej.

Skład

Substancje czynne: vitex agnus- castus TM 162 mg, caulophyllum thalictroides D4 81 mg, cyclamen purpurascens D4 81 mg, strychnos ignatii D6 81 mg, iris versicolor D2 162 mg, lilium lancifolium D3 81 mg oraz substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, magnezu stearynian.

Działanie

Lek łagodzi objawy takie jak:

- bolesność piersi – mastodynia,

- zaburzenia równowagi emocjonalnej.

Dawkowanie

- **Dorośli:** doustnie, 1 tabletka, dwa razy dziennie rano i wieczorem, popij szklanką wody.
- Lek Mastodynnon należy przyjmować przez co najmniej 2-3 miesiące – także w trakcie menstruacji.
- Jeśli po 6 tygodniach przyjmowania produktu leczniczego dolegliwości będą się utrzymywać, należy skontaktować się z lekarzem.
- Jeśli objawy powrócą po zakończeniu terapii, powinno się skontaktować z lekarzem.
- Jeżeli w trakcie terapii lekiem Mastodynnon jego działanie wydaje się za mocne bądź za słabe, należy skonsultować się z lekarzem.

Przeciwwskazania

- Nie stosować w przypadku na uczulenie na którykolwiek ze składników leku.
- Nie podawać dzieciom i młodzieży poniżej 18 lat.

Przechowywanie

- Lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.
- Nie stosować leku Mastodynnon po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Mastodynnon może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstotliwość występowania następujących działań niepożądanych nie może być sklasyfikowana na podstawie dostępnych danych:

- ciężkie reakcje alergiczne
 - obrzęki twarzy,
 - duszność
 - zaburzenia połykania
- (alergiczne) reakcje skórne
 - wysypka,
 - pokrzywka,
 - trądzik
- bóle i zawroty głowy,
- zaburzenia żołądkowo-jelitowe takie jak nudności czy bóle brzucha
- zaburzenia miesiączkowania

W przypadku pojawienia się pierwszych objawów nadwrażliwości lub reakcji alergicznych należy natychmiast przerwać stosowanie tabletek Mastodynnon. Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym również te niewymienione powyżej, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Przyjmowanie leków homeopatycznych może prowadzić do tymczasowego pogorszenia się istniejących objawów (wstępne pogorszenie). W takim przypadku należy przerwać terapię i skonsultować się z lekarzem.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjentka planuje przyjmować.

- Ze względu na możliwy wpływ owoców Vitex agnus castus na wydzielanie dopaminy (hormon współczulnego układu nerwowego) oraz na kobiece hormony płciowe, nie można wykluczyć wpływu leku Mastodynol na działanie innych leków o podobnych wskazaniach.

Stosowanie leku Mastodynol z jedzeniem i piciem

- Negatywny wpływ na działanie leków homeopatycznych może mieć ogólnie rozumiany szkodliwy tryb życia jak i substancje drażniąco-pobudzające na przykład kawa.

Ciąża i karmienie piersią

- Nie ma wskazań do stosowania leku w okresie ciąży.
- Dane z badań nad rozrodczością sugerują, że ekstrakt z owoców Vitex agnus-castus może mieć wpływ na laktację. Z tego względu nie zaleca się stosowania leku podczas karmienia piersią.
- Owoce Vitex agnus-castus mogą mieć wpływ na płodność, zatem w przypadku, gdy ciąża nie jest planowana, zaleca się stosowanie antykoncepcji.
- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią bądź przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Należy skonsultować się z lekarzem:
 - jeśli pacjentka choruje lub chorowała na estrogenozależnego raka,
 - jeśli pacjentka stosuje leki mające wpływ na wydzielanie dopaminy (hormon współczulnego układu, nerwowego) lub stosuje terapię hormonalną,
 - jeśli pacjentka w przeszłości cierpiała na

- zaburzenia przysadki mózgowej,
- jeśli objawy mają niejasny, nawrotowy lub przewlekły charakter, gdyż mogą one wynikać ze schorzenia wymagającego dokładniejszej diagnostyki,
- jeśli objawy pogorszą się podczas stosowania leku Mastodynon.
- Mastodynon nie powinien być stosowany u pacjentek, które nie rozpoczęły jeszcze regularnego miesiączkowania w okresie pokwitania.

Podmiot odpowiedzialny

Bionorica Polska Sp. z o.o.

ul. Leszno 14

01 – 192 Warszawa

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.