

Melilax Pediatric mikrowlewka doodbytnicza z promelaxin dla dzieci i niemowląt – 5gx6mikrowlewek

Opis produktu

Melilax jest innowacyjną mikrowlewką na bazie miodu, która łączy zrównoważone działanie usuwające, ochronne i łagodzące błonę śluzową odbytu, pomagająca w walce z uciążliwościami, podrażnieniami i stanem zapalnym, towarzyszącym zaparciom. Podwójne działanie Melilax uzyskiwane jest dzięki PROMELAXIN, kompleksowi miodów nektarowych i spadziowych, odpowiednio wyselekcjonowanych i przetworzonych na podstawie zawartości monosacharydów, polisacharydów i melanoidyn, wzbogaconemu o frakcję polisacharydową z aloesu i ślazu dzikiego. Melilax Pediatric ma działanie wydalające, które zapewnia bodziec aktywujący defekację. Ponadto Melilax Pediatric, dzięki swym cechom przypominającym śluz i dzięki swej lepkości, chroni błonę śluzową odbytu podczas przechodzenia stolca; odgrywając rolę nawilżacza, podobną do śluzu fizjologicznego. Te szczególne właściwości, połączone z działaniem antyoksydacyjnym, nadają produktowi właściwości ochronne i łagodzące błonę śluzową, zapewniając pośrednie działanie przeciwzapalne.

Zastosowanie

Do leczenia zaparcí u dzieci i niemowląt, również w przypadku nadwrażliwości trzewnej (jak w przypadku okrężnicy drażliwej),

szczelin, hemoroidów. Produkt oczyszcza jelito i zmniejsza uciążliwość, podrażnienia i stan zapalny towarzyszący zaparciom.

Sposób użycia

- niemowlęta od urodzenia do 1. roku życia: połowa mikrowlewki 5g;
- dzieci od 1. do 3. lat: 1 mikrowlewka 5g;
- dzieci od 3. do 12. lat: 1 mikrowlewka 5g. W przypadku uporczywych zaparć stosować 2 dawki jednocześnie.

Nałożyć kilka kropel produktu wokół odbytu i wprowadzić delikatnie wlewkę do odbytu. cisnąć do końca mikrowlewkę i następnie trzymać ją wciśniętą do momentu całkowitego wyciągnięcia wlewki, aby uniknąć zasysania produktu.

Składniki

Substancje czynne: 73,2%: Promelaxin aktywny kompleks miodów i polisacharydów z aloesu i ślazu dzikiego; substancje pomocnicze.

Ważne wskazówki

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub alergii na jeden ze składników.

W przypadku długotrwałych zaparć należy skonsultować się z lekarzem w celu wykluczenia innych schorzeń. Mikrowlewka jest jednorazowa dlatego nie może być ponownie użyta, gdy zużyje

się tylko połowę, jak w przypadku niemowląt.

Dystrybutor

Aboca Polska Sp.z o.o.
40-403 Katowice
ul. Oswobodzenia 1