# Olej rycynowy Oleum Ricini 105 ml

## Olej rycynowy Oleum Ricini 105 ml

## Opis

Phytopharm Olej rycynowy Oleum Ricini jest o działaniu przeczyszczającym, stosowany tradycyjnie w zaparciach.

## Składniki

Substancję czynną leku stanowi tłoczony na zimno olej rycynowy (Ricini Oleum virginale) z nasion rącznika pospolitego (Ricinus communis) 100g/100g.

## Dawkowanie

- Dzieci 7-12 lat: 5-15 ml (odmierzyć za pomocą dołączonej miarki) tylko pod kontrolą lekarza wg jego zaleceń – raz na dobę.
- 12 lat i dorośli: 15-30 ml – raz na dobę.

## Działanie

Oleum Ricini Phytopharm jest silnym środkiem przeczyszczającym. Preparat podany doustnie ulega w jelicie cienkim rozpadowi do gliceryny i kwasu rycynolowego. Proces ten odbywa się w obecności żółci i soku trzustkowego. Następnie kwas rycynolowy ulega stopniowemu zmydlaniu do mydeł sodowych i potasowych. Kwas i mydła wykazują działanie drażniące, wzmagają perystaltykę jelita cienkiego, zwiększają również przenikanie wody i elektrolitów przez ściany jelit,

ograniczając równocześnie jej wchłanianie. Wypróżnienie następuje w ciągu 2 – 4 godzin po podaniu oleju rycynowego.

# Wskazania

Stosowany tradycyjnie w zaparciach.

# Kiedy nie stosować

Kiedy nie stosować:Jeśli pacjent ma uczulenie na olej rycynowy.W stanach zapalnych narządów jamy brzusznej (np.: wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna-Leśniowskiego, zespół jelita drażliwego, rzekomobłoniaste zapalenie jelit, megacolon, czynna choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, zapalenie trzustki, zapalenie wyrostka robaczkowego),W przypadku niedrożności jelit (niedrożność mechaniczna jaki i czynnościowa jelit),W przypadku niedrożności dróg żółciowych oraz innych schorzeń dróg żółciowych,W przypadku krwawienia odbytniczego,Gdy występują bóle brzucha, nudności, wymioty, ciąża, menstruacja.

# Działania niepożądane

Może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

# Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

# Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich

lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz, które pacjent planuje stosować. Ze względu na działanie przeczyszczające oleju rycynowego, nie zaleca się przyjmowania jednocześnie innych leków; należy zachować kilkugodzinny odstęp czasu przedzastosowaniem innych leków. W przypadku stosowania sulfafurazolu, aspiryny, izoniazydu, witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, glikozydów nasercowych (glikozydów naparstnicy, strofantyny), leków antyhistaminowych przed zastosowaniem oleju rycynowego należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

# Ciąża i karmienie piersią

W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem. Nie stosować.

# Stosowanie u dzieci i młodzieży

Stosowanie u dzieci powyżej 7. roku życia do 12. roku życia jest możliwe tylko pod kontrolą lekarza. Nie stosować u dzieci poniżej 7. roku życia. Stosowanie u młodzieży powyżej 12. roku życia zgodnie ze schematem dawkowania.