

Pelafen MED 100 ml

Pelafen MED syrop 100 ml

Opis

Pelafen MED to tradycyjny roślinny syrop, zawierający suchy wyciąg z korzenia pelargonii. Stosuje się go w objawowym leczeniu przeziębienia u dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 3 lat.

Składniki

Substancją czynną jest suchy wyciąg z korzenia pelargonii (*Pelargonii radicis extractum siccum*). 2,5 ml syropu zawiera 20 mg suchego wyciągu (4-25:1) z *Pelargonium sidoides* DC i/lub *Pelargonium reniforme* Curt., radix (korzenia pelargonii). Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 11% (m/m). Pozostałe składniki to: maltodekstryna, maltitol ciekły (E 965), sorbitol ciekły, niekrystalizujący (E 420), potasu sorbinian (E 202), kwas cytrynowy (E 330), woda oczyszczona.

Dawkowanie

- Dzieci 6-11 lat: 2,5 ml syropu 2 razy na dobę.
- Dzieci w wieku powyżej 12 lat, dorośli oraz osoby w podeszłym wieku: 2,5 ml syropu 3 razy na dobę.
- Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
- Podawać doustnie. PELAFEN Syrop zawiera miarkę, która służy do odmierzenia odpowiedniej ilości syropu.
- Należy wstrząsnąć butelkę przed użyciem. Jeśli mimo stosowania leku objawy utrzymują się dłużej niż 7 dni należy skonsultować się z lekarzem.
- Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia dawki pominiętej.

- W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Wskazania

Syrop Pelafen jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym stosowanym w objawowym leczeniu przeziębienia. Produkt jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym do stosowania w określonych wskazaniach wynikających wyłącznie z długotrwałego stosowania. Pelafen jest przeznaczony do stosowania u osób dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Kiedy nie stosować

Pelafen® nie powinien być stosowany w przypadku: nadwrażliwości na substancję czynną (wyciąg z korzenia pelargonii) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Działania niepożądane

Pelafen może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.