

Pirolam 10 mg/g żel – 20g

Pirolam 10 mg/ g, żel, 20 g

PIROLAM 1% żel 20 g

Pirolam to lek przeciwgrzybiczy przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Lek stosuje się w:

leczenie grzybic gładkiej skóry,

leczenie grzybic skóry owłosionej,

leczenie grzybic stóp,

leczenie grzybic kończyn dolnych.

Grzybica skóry gładkiej – może występować na całym ciele, najczęściej występuje na bezwłosej skórze głowy, szyi, twarzy i ramionach. Charakterystyczne są ogniska w kształcie pierścieni w kolorze różowym do czerwonego. Są pokryte grudkami i łuskami, rozchodzą się po obwodzie i mają tendencję do ustępowania pośrodku.

Grzybica skóry owłosionej – występuje na skórze owłosionej w postaci dużych, okrągłych ognisk, które charakteryzują się łuszczeniem się skóry i łamaniami włosów lub w postaci szarozółtych strupów wrastających w skórę.

Grzybica stóp – występuje na jednej lub dwóch stopach, najczęściej między palcami. Pojawia się również na podeszwie stopy (podbiciu). Zmiany grzybicze między palcami charakteryzują się maceracją (złuszczeniem). Zmiany te mogą mieć również charakter pęcherzykowy. Nagłe zaostrzenia z wysiewem licznych bąbelków i pęcherzy zwykle występują w czasie upałów. Swędzenie, ból, stan zapalny i pęcherze mogą być łagodne lub ciężkie. W przypadku długotrwałej grzybicy stóp konieczna jest konsultacja z lekarzem, gdyż paznokcie mogą ulec zakażeniu. Pirolam nie jest stosowany w leczeniu grzybicy paznokci.

Grzybica podudzia – objawami są grudki w okolicy mieszków włosowych i pękanie włosów na powierzchni skóry.

Jeśli nie masz pewności co do przyczyny infekcji, przed zażyciem tego leku skonsultuj się z lekarzem.

AKCJA

Lek ten działa przeciwko grzybom zwanym dermatofitami, grzybami drożdżopodobnymi, pleśniami i mieszanymi zakażeniami grzybiczymi na skórze. Wykazuje również działanie przeciwzapalne, co jest ważne zwłaszcza, gdy grzybicy towarzyszy stan zapalny.

Lek przenika przez skórę przez naskórek, mieszki włosowe i gruczoły łojowe.

SPOSÓB UŻYCIA

Stosowanie u dorosłych i dzieci powyżej 6 roku życia:

Lek stosuje się miejscowo na skórę.

Zazwyczaj Pirolam nakłada się dwa razy dziennie na zmienioną chorobowo skórę, lekko ją pocierając lub pozostawiając do wyschnięcia.

Leczenie należy kontynuować aż do ustąpienia objawów choroby.

Optymalny czas trwania leczenia to 3 tygodnie.

Aby zapobiec nawrotom, zaleca się kontynuowanie leczenia przez 10 dni po ustąpieniu zmiany.

Jeśli objawy nie ustąpią po 4 tygodniach leczenia, należy skontaktować się z lekarzem.

Nie stosować opatrunków i plastrów.

WAŻNY

Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Pirolam należy poinformować lekarza:

jeśli pacjent ma cukrzycę, problemy z krążeniem w dłoniach i stopach, zaburzenia odporności (np. zakażenie wirusem HIV, pacjenci po przeszczepie, pacjenci otrzymujący jednocześnie kortykosteroidy, pacjenci z nawracającym lub długotrwałym półpaścem) lub opryszczka);

jeśli u pacjenta występują problemy skórne, takie jak łuszczyca lub inne przewlekłe choroby skóry.

Lek przeznaczony do stosowania wyłącznie na skórę.

Nie drap swędzących, zakażonych obszarów.

Chroń oczy przed kontaktem z lekiem.

KOMPOZYCJA

Substancją czynną jest cyklopiroks z olaminą. Każdy gram żelu zawiera 10 mg cyklopiroksu olaminy.

Pozostałe składniki to: glikol propylenowy, parahydroksybenzoesan metylu, parahydroksybenzoesan propylu, etanol 96%, glicerol, karbomer, trolamina, woda oczyszczona.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany stanowi zagrożenie dla Twojego życia lub zdrowia.