

Protego Simeticon Max 30 kapsułek

Protego Simeticon Max 30 kapsułek

Opis

Protego Simeticon Max to wyrób medyczny pomagający przy uczuciu pełności i wzdęciach. Produkt przeznaczony dla dzieci od 12 roku życia i dorosłych.

Składniki

Wyrób medyczny zawiera 240 mg symetykonu w kapsułce miękkiej żelatynowej. Składnikami otoczki są: żelatyna wieprzowa, glicerol. Wyrób medyczny nie zawiera cukru ani barwników.

Przeznaczenie produktu

Protego Simeticon Max przeznaczony jest do stosowania pomocniczo w celu przygotowania pacjentów do badań diagnostycznych jamy brzusznej (ultrasonografii, endoskopii, radiografii i kolonoskopii), w celu usunięcia z przewodu pokarmowego gazów i powietrza, co poprawia jakość uzyskiwanych obrazów.

Sposób użycia wyrobu medycznego

Objawy związane z napięciem i uciskiem w jelitach:

Grupa wiekowa	Dawkowanie
Dorośli	Doraźnie, 1 kapsułka, 2–4 razy dziennie. Maksymalnie 4 kapsułki dziennie (960 mg symetykonu).
Dzieci od 12. do 18. roku życia	Doraźnie, 1 kapsułka dziennie.

Przygotowanie do badań diagnostycznych:

Grupa wiekowa	Dawkowanie
Dorośli	1 kapsułka wieczorem w dniu poprzedzającym badanie diagnostyczne i 1 kapsułka rano, na czczo, w dniu badania diagnostycznego.
Dzieci od 12. do 18. roku życia	1 kapsułka wieczorem w dniu poprzedzającym badanie diagnostyczne i 1 kapsułka rano, na czczo, w dniu badania diagnostycznego.

Przyjmować przed lub po posiłku, popijając odpowiednią ilością płynu. W trakcie stosowania preparatu nie zaleca się picia napojów gazowanych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Nie należy przekraczać zalecanej dawki.
- Nie wolno stosować więcej niż 4 kapsułki dziennie u dorosłych i 1 kapsułkę dziennie u dzieci powyżej 12 roku życia.
- Jeżeli dolegliwości nie ustępują po 7 dniach należy skonsultować się z lekarzem.
- Symetykon może zmniejszać biodostępność jednocześnie zażywanych leków.
- W przypadku konieczności jednoczesnego stosowania wyrobu z innymi lekami, należy zachować co najmniej godzinną przerwę pomiędzy zażyciem wyrobu medycznego Protego SIMETICON MAX i innych preparatów.
- W przypadku jednoczesnego stosowania lewotyroksyny oraz symetykonu należy zachować 4 godzinny odstęp.
- Nie należy stosować produktu po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze

pokojuowej.

- Nie stosować u osób uczulonych na którykolwiek składnik produktu.
- Kobiety w ciąży lub karmiące piersią przed zastosowaniem powinny skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.