

Pudroderm – 140g

Pudroderm – 140g

Opis produktu

Pudroderm to produkt leczniczy w postaci zawiesiny stosowanej na skórę. Działa miejscowo znieczulająco, przeciwświądowo, ściągająco i osłaniająco, dzięki czemu może być stosowany w stanach zapalnych skóry przebiegających z wysypką, obrzękiem, świądem, również w świądzie neurogennym czy po ukąszeniach owadów.

Zawarta w składzie benzokaina wywołuje miejscowe znieczulenie. Tlenek cynku to substancja o silnym działaniu osłaniającym, ściągającym i słabym działaniu przeciwbakteryjnym. Lewomentol przeciwdziała świądowi i wywołuje miejscowe uczucie chłodu.

Wskazania

Lek Pudroderm stosuje się:

pomocniczo w przypadku: ospy wietrznej, półpaśca, obrzęku, świądu, w tym świądu neurogennego, w stanach zapalnych skóry przebiegających z wysypką,

po ukąszeniach owadów np. przez osy, meszki, komary,

po naświetlaniach radiologicznych pod kontrolą lekarza.

Skład

1g zawiesiny zawiera:

substancje czynne: benzokaina (Benzocainum) 9,8mg, lewomentol (Levomentholum) 9,8mg, cynku tlenek (Zinci oxidum) 245mg,

substancje pomocnicze: talk, glicerol 99,5%, woda oczyszczona.

Działanie

Miejscowo znieczulające, przeciwświądowe, osłaniające i ściągające.

Dawkowanie

Lek należy stosować na skórę: na zmienione chorobowo miejsca na skórze nakładać niezbyt cienką warstwę zawiesiny, stosować od 2 do 3 razy na dobę, lub w razie potrzeby częściej.

Przed każdym użyciem zawartość opakowania należy dokładnie wymieszać przez energiczne wstrząsanie.

Nie przykrywać opatrunkiem ani nie wcierać w skórę.

Pozostałości leku na skórze łatwo się czyści bieżącą, ciepłą wodą.

Przeciwwskazania

Uczulenie na którykolwiek ze składników leku.

Nie stosować: na rany, na duże powierzchnie skóry, na uszkodzoną skórę, pod opatrunki okluzyjne.

Nie stosować długotrwale.

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Przechowywanie

Przechowywać poza zasięgiem dzieci, w temperaturze nieprzekraczającej 25°C.

Działania niepożądane

Po zastosowaniu leku mogą wystąpić objawy miejscowego podrażnienia skóry. W przypadku nasilenia się objawów podrażnienia lub gdy objawy podrażnienia nie ustąpią po kilku dniach, należy zaprzestać stosowania Pudrodermu.

Interakcje

Benzokaina zaburza działanie sulfonoamidów. Miejscowo znieczulające działanie benzokainy ulega osłabieniu w obecności nadtlenu benzoilu, który często jest składnikiem stosowanych miejscowo leków przeciwtwardzikowych. Z tego powodu przed aplikacją produktu Pudroderm u pacjentów stosujących produkty zawierające nadtlenek benzoilu, należy dokładnie oczyścić skórę z ich pozostałości.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z lekiem.

Nie stosować na rany i uszkodzoną skórę.

Nie odnotowano przypadków przedawkowania w przypadku stosowania zgodnie ze wskazaniem oraz zalecanym dawkowaniem i sposobem użycia.

Stosowanie u dzieci i młodzieży:

nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku do 2 roku życia, gdyż miejscowe stosowanie benzokainy może prowadzić do wystąpienia reakcji nadwrażliwości oraz do methemoglobinemii,

ostrożnie stosować u dzieci powyżej 2 lat.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność:

brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania

produktu u kobiet w ciąży, w okresie laktacji oraz potwierdzających wpływ produktu na płodność.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
brak danych dotyczących wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Podmiot odpowiedzialny
Starpharma Sp. z o.o.
ul. Stawki 2, 23 piętro
00-193 Warszawa

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.