

Pyrantelum

lek

przeciw pasożytniczy

dla

owsików 0,2g/5ml – 15ml

Pyrantelum lek przeciw pasożytniczy dla owsików 0,2 g/5 ml – 15 ml

Opis

Produkt leczniczy Pyrantelum 250mg/5ml jest zawiesiną doustną o smaku morelowym. Jest to lek przeznaczony do stosowania u dzieci i dorosłych w przypadku zarażenia robakami obłymi, w tym glistami ludzkimi lub owsikami.

Kompozycja

Substancja czynna leku: pyrantel. 5 ml zawiesiny doustnej zawiera pyrantel (w postaci embonianu pyrantelu) – 250 mg oraz inne składniki: benzoesan sodu (E 211), karmeloza sodu, sorbitol 70% (E 420), glicerol, krzemian glinowo-magnezowy, polisorbat 80, powidon, aromat morelowy, emulsja symetykonowa, jednowodny kwas cytrynowy, wodorotlenek sodu, woda oczyszczona.

Akcja

Substancja czynna zawarta w Pyrantelum 250mg/5ml, czyli pyrantel, oddziałuje na mięśnie pasożytów jelitowych (glisty). Gdy pasożyty zostaną unieruchomione, ruchy jelit usuwają je. Zaletą stosowania pyrantelu jest m.in. fakt, że nie podrażnia jelit, a także nie przyczynia się do ruchu robaków. Lek działa na pasożyty we wczesnym stadium rozwoju i na ich dojrzałe formy, ale nie ma wpływu na larwy podczas ich migracji w tkankach.

Aplikacja

Produkt leczniczy Pyrantelum 250mg/5 ml zawiesina doustna wskazany do stosowania w zakażeniu jelitowym glistami: zarażeniem owsikami, glistą ludzką, tęgoryjcem dwunastniczym, tęgoryjcem amerykańskim. Przeznaczony do stosowania u dzieci i dorosłych.

Dodatkowe informacje

Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się ostrożność przy stosowaniu leku u dzieci poniżej 2 roku życia, u pacjentów z zaburzeniami

czynności wątroby, u pacjentów niedożywionych, u pacjentów z niedokrwistością (niedokrwistością). Lek zawiera sorbitol (5 ml leku zawiera 3,06 g sorbitolu 70%), który może mieć lekkie działanie przeczyszczające. Osoby z nietolerancją niektórych cukrów powinny zgłosić to lekarzowi.

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku. Nie stosować podczas stosowania piperazyny, a także podczas leczenia miastenii (choroby mięśni szkieletowych). Nie zaleca się stosowania u kobiet w ciąży i karmiących.

Skutki uboczne

Podczas przyjmowania leku mogą wystąpić działania niepożądane: zaburzenia żołądkowo-jelitowe: nudności, wymioty, bóle brzucha, zaburzenia łaknienia, biegunka, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych; zaburzenia układu nerwowego: senność lub bezsenność, bóle i zawroty głowy; zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: alergiczne wysypki skórne.

Dawkowanie

Stosuj zgodnie z zaleceniami lekarza. Przyjmowany doustnie z posiłkiem lub tuż po posiłku. Dobrze wstrząsnąć przed użyciem. Przed podaniem leku nie jest konieczne podawanie środka przeczyszczającego. Dawka dla dorosłych i dzieci o masie ciała powyżej 10 kg: w przypadku glistnicy: z reguły skuteczne jest podanie jednorazowej dawki, ale w przypadku braku poprawy dawkę należy powtórzyć po 2-3 tygodniach; w przypadku owsików: podać pojedynczą dawkę 11 mg na kg masy ciała, dawkę powtórzyć po 2-3 tygodniach; w przypadku zarażenia tęgoryjcem dwunastniczym lub tęgoryjcem amerykańskim: dawka 11 mg na kg masy ciała podawana raz dziennie przez 3 kolejne dni. Szczegółowa tabela z dawkowaniem leku w zależności od masy ciała znajduje się na ulotce. Do odmierzania dawek zaleca się używanie miarki dołączonej do opakowania. W przypadku owsików zaleca się leczenie całej rodziny pacjenta, a jednocześnie zaleca się przestrzeganie zasad higieny.

Tagi produktów

Biegunka