

Pyrantelum Owix 250 mg/5ml zawiesina doustna 15 ml

Opis

Owix to produkt leczniczy przeznaczony dla dzieci w wieku od 2 lat i dorosłych w leczeniu zakażenia jelitowego owsikami – robakami obłymi typu nicieni barwy białej.

Składniki

Substancja czynna: pyrantel 5 ml zawiesiny doustnej zawiera 250 mg pyrantelu (w postaci pyrantelu embonianu). Pozostałe składniki: sodu benzoesan (E 211), karmeloza sodowa, sorbitol 70% (E 420), glicerol, glinu-magnezu krzemian, polisorbát 80, powidon, aromat morelowy (zawiera etanol, glikol propylenowy, geraniol, alkohol benzyłowy), emulsja symetykonu, kwas cytrynowy jednowodny, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

Dawkowanie

Owix należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i dzieci

Zalecana dawka u dorosłych i dzieci od 2 lat o masie ciała od 11 kg to:

11 mg/kg mc. jednorazowo.

Dawkę tę należy powtórzyć po dwóch lub trzech tygodniach od przyjęcia pierwszej dawki.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

Jeśli objawy utrzymują się po podaniu drugiej dawki należy

skontaktować się z lekarzem.

Dawkowanie zawiesiny doustnej Owix w zależności od masy ciała:

Masa ciała	Dawka jednorazowa (ml)	Dawka jednorazowa (mg)
dzieci o mc. <11 kg	należy stosować jedynie pod nadzorem lekarza.	
11-16 kg	2,5 ml	125 mg
17-28 kg	5,0 ml	250 mg
29-39 kg	7,5 ml	375 mg
40-50 kg	10,0 ml	500 mg
51-62 kg	12,5 ml	625 mg
63-75 kg	15,0 ml	750 mg
Dorośli o mc. > 75 kg	20,0 ml	1000 mg

Do opakowania dołączona jest miarka z podziałką, ułatwiająca dawkowanie. Przed użyciem wstrząsnąć do uzyskania jednorodnej zawiesiny.

Działanie

Leczenie zakażenia owsikami, glistami i tęgoryjcem za pomocą Pyrantelumu jest szybkie i proste pod warunkiem zastosowania odpowiedniej dawki. Składnik aktywny – pyrantel, działa na mięśnie pasożytów jelitowych (robaków obłych). Unieruchomione pasożyty zostają usunięte z jelita wskutek naturalnych ruchów jelit. Pyrantel nie podrażnia jelit ani nie wywołuje przemieszczania się robaków. Działa na formy dojrzałe i pasożyty we wczesnym stadium rozwoju, natomiast nie działa na larwy w trakcie ich migracji w tkankach.

Wskazania

Pyrantelum to preparat polecany do zażywania w:

- owsicy lub glistnicy u dzieci i dorosłych,
- zakażeniach tęgoryjcem dwunastnicy lub tęgoryjcem amerykańskim.

Kiedy nie stosować Owix

Pyrantelum OWIX nie powinny przyjmować osoby, u których występuje nadwrażliwość na którykolwiek jego składnik. Przeciwwskazanie stanowi także jednoczesne leczenie miastenii oraz przyjmowanie piperazyny.

Działania niepożądane

Pyrantelum może wywoływać u niektórych pacjentów występowanie działań niepożądanych. Skutki uboczne terapii występują jednak dość rzadko, a wśród zgłaszanych dolegliwości wymieniono:- zaburzenia snu,- senność lub bezsenność, – zawroty i bóle głowy, – zaburzenia łaknienia, – bóle brzucha, – nudności, – wymioty, – biegunkę, – zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, – wysypki skórne o charakterze alergicznym.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W składzie Pyrantelum OWIX znajduje się sorbitol, dlatego nie powinien być przyjmowany przez pacjentów z rzadką dziedziczną nietolerancją fruktozy. Ponadto sorbitol może mieć łagodnie działanie przeczyszczające. Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania u pacjentów z:- nieprawidłową czynnością wątroby, – niedokrwistością, – niedożywionych. W przypadku zaburzeń czynności wątroby zaleca się regularne monitorowanie aktywności AspAT we krwi, wskazane może być także zmniejszenie dawkowania.

Stosowanie innych leków

Podczas jednoczesnego stosowania Pyrantelum OWIX z innymi lekami może się zwiększać stężenie teofiliny w osoczu. Ze względu na antagonizm działania, nie należy stosować pyrantelu jednocześnie z piperazyną, gdyż może to prowadzić do

osłabienia działania obu leków.

Ciąża i karmienie piersią

W okresie laktacji stosowanie preparatu jest niezalecane. Ze względu na brak badań nie wiadomo, czy substancja czynna przenika do mleka kobiecego. Jeśli kobieta w okresie laktacji musi przyjmować pyrantel, to konieczne jest odstawienie dziecka od piersi.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Przed zastosowaniem u dzieci Pyrantelum w wieku poniżej 2 lat należy skonsultować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i maszyn

Brak danych dotyczących wpływu Owix na prowadzenie pojazdów i obsługiwane maszyn.