

Rowatinex 30 kapsułek

Rowatinex 30 kapsułek

Opis

Rowatinex ma działanie moczopędne oraz delikatnie rozkurczowe na drogi moczowe. Pomaga w łatwiejszym usuwaniu małych złogów kamieni nerkowych.

Składniki

Jedna kapsułka zawiera:

α -pinenum 24,8 mg

β -pinenum 6,2 mg

Camphenum 15,0 mg

Cineolum 3,0 mg

Fenchonum 4,0 mg

Borneolum 10,0 mg

Substancje pomocnicze: Olej z oliwek 33,0 mg

Powłoczka kapsułki: żelatyna wołowa, glicerol 85%, etylu parahydroksybenzoesan sodowy, propylu parahydroksybenzoesan sodowy, żółcień pomarańczowa FCF 85% (E110), żółcień chinolinowa WS 70% (E104).

Dawkowanie

Przeznaczony do stosowania doustnego.

Dorośli: Jeśli lekarz nie zaleci inaczej 1 kapsułka, 3–4 razy

na dobę, 30 minut przed posiłkami.

Zaleca się przyjmowanie zwiększonej ilości płynów niż normalnie w czasie przyjmowania preparatu. W przypadku wrażenia, że działanie Rowatinex jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Działanie

Preparat działa rozkurczająco na mięśnie gładkie dróg moczowych, ułatwiając rozpad i wydalanie złożeń z dróg moczowych. Poprawia czynność nerek oraz nasila diurezę. Posiada także właściwości przeciwzapalne i przeciwbakteryjne.

Wskazania

Leczenie i profilaktyka kamicy dróg moczowych oraz kamicy nerkowej pomocniczo w stanach zapalnych układu moczowego.

Kiedy nie stosować

Nie należy stosować Rowatinex w przypadku:

- nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu Rowatinex
- ciąży,
- okresu karmienia piersią,
- ostrych lub przewlekłych schorzeń nerek.

Działania niepożądane

Może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

U niewielkiej liczby pacjentów mogą wystąpić lekkie, przejściowe objawy ze strony żołądka, np.: nudności. W przypadku wystąpienia wymiotów lub utrzymywania się innych

objawów należy przerwać stosowanie.

U niektórych osób w czasie stosowania Rowatinex mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych działań niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność jeśli wystąpiły objawy bólowe, zwłaszcza w okolicy lędźwiowej, kolka nerkowa (charakteryzująca się nawracającym bólem zazwyczaj rozpoczynającym się w okolicy lędźwiowej lub w okolicy nerki), zaburzeniami w oddawaniu moczu, krwimocz, itp.

W przypadku wystąpienia powyższych objawów należy skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Dotychczas nie stwierdzono przypadków interakcji z innymi lekami, jednakże na podstawie danych doświadczalnych dla olejków eterycznych można przypuszczać, że przyjęcie może mieć wpływ na metabolizm innych leków, objawiający się osłabieniem ich działania.

Ciąża i karmienie piersią

Nie stosować w okresie ciąży oraz w czasie karmienia piersią.

Stosowanie leku u dzieci i

młodzieży

Nie należy stosować u dzieci.