# Sedomix mikstura uspokajająca płyn 125 g

## Opis

Sedomix to tradycyjny roślinny produkt leczniczy stosowany w stanach pobudzenia nerwowego. Preparat wykazuje działanie uspokajające i ułatwiające zasypianie. Jest przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach, a jego skuteczność opiera się wyłącznie na długotrwałym stosowaniu i doświadczeniu. Może być stosowany przy przejściowym napięciu nerwowym i trudnościach z zasypianiem.

## Składniki

100 g produktu zawiera:

- wyciąg z szyszek chmielu (Humuli lupuli extractum fluidum) – 30,0 g;
- wyciąg z ziela owsa (Avenae herbae recentis intractum) – 20,0 g;
- nalewka z ziela dziurawca (Hyperici herbae tinctura) – 10,0 g;
- wyciąg z ziela melisy (Melissae herbae tinctura) – 10,0 g;
- nalewka z kłącza kozłka (Valerianae radicis tinctura) – 10,0 g;
- nalewka z kwiatostanu głogu (Crataegi inflorescentiae tinctura) – 10,0 g;
- nalewka z owoców róży (Rosae fructi tinctura) – 10,0 g.

## Dawkowanie

- Dorośli w pobudzeniu nerwowym: 5 ml preparatu 3 razy

dziennie. W problemach z zasypianiem: 5 ml preparatu na pół godziny przed porą snu.
- Młodzież powyżej 12 lat w pobudzeniu nerwowym: 3 ml preparatu 3 razy dziennie. W problemach z zasypianiem: 3 ml preparatu na pół godziny przed porą snu.
- Należy odmierzyć pojedynczą dawkę preparatu poprzez przelanie leku z butelki do miarki, a następnie dolać wody lub soku owocowego.

# Kiedy nie stosować

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu leczniczego. Sedomix zawiera alkohol i z tego powodu jest przeciwwskazany pacjentom cierpiącym na uszkodzenia wątroby, niewydolność nerek, alkoholizm, padaczkę, uszkodzenia mózgu, choroby umysłowe.

# Działania niepożądane

Może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

# Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
- Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
- Nie zaleca się również kobietom w ciąży czy mamom karmiącym. W tym przypadku warto skonsultować się z lekarzem.

- Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i zawartość alkoholu.