

Starazolin Free Krople do oczu 0,5mg/ml – 10ml

Krople do oczu Starazolin Free 0,5mg/ml – 10ml

Opis produktu

Starazolin Free to roztwór kropli do oczu, którego substancją czynną jest chlorowodorek tetryzoliny, należący do grupy leków zwężających naczynia krwionośne oka. Lek przeznaczony do stosowania w przypadku podrażnienia i zaczerwienienia oka wywołanego dymem, wiatrem, chlorowaną wodą lub światłem oraz w przypadku alergicznego zapalenia oka.

Wskazania

Starazolin Free 0,5 mg stosuje się w przypadku niezakaźnego podrażnienia lub zaczerwienienia oczu spowodowanego dymem, wiatrem, chlorowaną wodą lub światłem, a także w przypadku alergicznego zapalenia oka.

Kompozycja

1 ml kropli do oczu zawiera:

substancja czynna: chlorowodorek tetryzoliny 0,5 mg,
pozostałe składniki to: chlorek sodu, kwas borowy, boraks, woda oczyszczona.

Akcja

Zwężenie naczyń krwionośnych oka.

Dawkowanie

Dzieci w wieku od 2 do 12 lat: Nie zaleca się stosowania tego leku u dzieci w wieku od 2 do 12 lat bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia: jeśli nie zalecono inaczej, zakraplać po jednej kropli do każdego podrażnionego oka 2-3 razy dziennie.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na chlorowodorek tetryzoliny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Jaskra z wąskim kątem przesączania.

Ciężka choroba serca lub naczyń krwionośnych.

Guz chromochłonny.

Zaburzenia metaboliczne, takie jak nadczynność tarczycy, porfiria lub cukrzyca.

Kiedy przyjmujesz inhibitory monoaminooksydazy (IMAO),

trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne lub inne leki, które mogą podnieść ciśnienie krwi.

Jeśli masz łagodne powiększenie gruczołu krokowego.

U dzieci poniżej 2 roku życia.

Ten lek jest przeciwwskazany w przypadku nadwrażliwości kontaktowej na srebro.

Magazynowanie

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki wynosi 28 dni.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C po pierwszym otwarciu.

Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (występuje u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

zwiększony obrzęk błony śluzowej oka (przekrwienie reaktywne), pieczenie lub suchość błony śluzowej oka, kołatanie serca, ból głowy, drżenie, osłabienie, pocenie się, podwyższone ciśnienie krwi, przyspieszone bicie serca.

Rzadko (występuje u mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

rozszerzenie źrenic.

Bardzo rzadko (dotyczy mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

keratynizacja (keratynizacja) powierzchni spojówki, prowadząca do zamknięcia kanalików łzowych i łzawienia spowodowanego problemami z odpływem łez po długotrwałym stosowaniu tego leku.

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

kłucie w oku lub wokół niego, zaczerwienienie, obrzęk, ból, swędzenie, niewyraźne widzenie, podrażnienie spojówek.

Interakcje

Jednoczesne stosowanie następujących leków może nasilać działanie zwężające naczynia krwionośne i zwiększać ciśnienie krwi:

Inhibitory MAO stosowane w leczeniu choroby Parkinsona lub depresji, m.in. selegilina, rasagilina, moklobemid, tranylcypromina, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, m.in. amitryptylina i maprotylina

inne leki, które mogą podnieść ciśnienie krwi.

Ostrzeżenia i środki

Przed rozpoczęciem stosowania leku Starazolin Free należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

Jeśli masz suchy nieżyt nosa, zapalenie rogówki i spojówki,

Gdy pacjent podniósł ciśnienie w gałce ocznej (jaskra).

Jeśli odczuwasz silny ból oka, ból głowy, utratę wzroku, „pływające” plamy w polu widzenia, silne ostre lub jednostronne zaczerwienienie oka, ból pod wpływem światła lub podwójne widzenie, natychmiast skontaktuj się z lekarzem.

Jeśli podrażnienie lub zaczerwienienie oka jest spowodowane poważną chorobą oczu, taką jak infekcja, ciała obce lub chemiczne uszkodzenie rogówki, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Długotrwałe i nieprawidłowe podawanie tego leku, zwłaszcza w dawkach większych niż zalecane, może osłabiać jego działanie i prowadzić do zaczerwienienia spojówek i uporczywego przekrwienia błony śluzowej nosa.

Należy unikać długotrwałego stosowania, zwłaszcza u dzieci.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, podejrzewa, że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługi maszyn

Po zakropleniu tego leku może wystąpić rozszerzenie źrenic, oślepienie światłem lub niewyraźne widzenie, co może ograniczyć zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Podmiot odpowiedzialny

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińskiej 19

83-200 Starogard Gdański

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, informacje dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego lub skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany stanowi zagrożenie dla Twojego życia lub zdrowia.