

Stoperan 2mg – 18kapsułek

Wskazania

Biegunka, także w biegunkach, na które nie pomagają inne leki dostępne bez recepty: w alergiach pokarmowych, nietolerancji laktozy i glutenu, w biegunce stresowej, w biegunce wywołanej zespołem jelita drażliwego (IBS), a nawet w biegunce towarzyszącej cukrzycy; dla dorosłych, osób starszych oraz u dzieci od 6. roku życia.

Skład

1 kapsułka zawiera: substancję czynną: loperamidu chlorowodorek 2mg oraz substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, talk, magnezu stearynian. Skład kapsułki żelatynowej: żelatyna, erytrozyna (E127), żółcień chinolinowa (E104).

Działanie

Leczy zarówno pierwsze, jak i nasilone objawy biegunki, przeciwdziała negatywnym następstwom biegunki.

Dawkowanie

Doustnie.

– dorośli i dzieci w wieku powyżej 12. lat: biegunka ostra –

pierwsza dawka 2 kapsułki, a następnie 1 kapsułka po każdym luźnym wypróżnieniu. Nie należy stosować dawki większej niż 8 kapsułek na dobę; biegunka przewlekła: początkowo 1 kapsułka 2 razy na dobę, w razie potrzeby dawkę można zwiększyć do 4-6 kapsułek na dobę. U dzieci dawkę leku należy dostosować do masy ciała (3 kapsułki/20kg masy ciała).

– dzieci w wieku od 9. do 12. lat: biegunka ostra: 1 kapsułka po każdym luźnym wypróżnieniu. Nie należy stosować dawki większej niż 3 kapsułki na dobę; biegunka przewlekła: 1 kapsułka po każdym luźnym wypróżnieniu. Nie należy stosować dawki większej niż 3 kapsułki na dobę;;

– dzieci w wieku od 6. do 8. lat: biegunka ostra: 1 kapsułka po każdym luźnym wypróżnieniu. Nie należy stosować dawki większej niż 3 kapsułki na dobę; biegunka przewlekła: 1 kapsułka po każdym luźnym wypróżnieniu. Nie należy stosować dawki większej niż 2 kapsułki na dobę.

Nie ma konieczności modyfikacji dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek oraz u pacjentów w podeszłym wieku. Biegunka może ustąpić już po pierwszej dawce. Kapsułki należy przyjmować w całości, jednak w razie problemów z połykaniem można wsypać zawartość do niewielkiej ilości wody i wypić.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość (uczulenie) na loperamid lub którykolwiek z pozostałych składników leku; w stanach, w których niepożądane jest spowolnienie perystaltyki jelit z powodu możliwego ryzyka wystąpienia ciężkich powikłań, w tym niedrożności jelit, okrężnicy olbrzymiej i toksycznego rozszerzenia okrężnicy, stosowanie leku należy natychmiast przerwać w przypadku wystąpienia zaparcia, wzdęcia brzucha lub niedrożności jelit; niedrożność jelit, ostre wrzodziejące zapalenie jelita grubego, ostre rzucie krwotocznego zapalenia jelita grubego,

rzekomobłoniaste zapalenie jelit, zwłaszcza związanym z podawaniem antybiotyków o szerokim zakresie działania; bakteryjne zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy spowodowanym chorobotwórczymi bakteriami z rodzaju Salmonella, Shigella i Campylobacter; ostra czerwotka z krwią w kale i przebiegająca z podwyższoną temperaturą ciała. Nie zaleca się stosowania leków zawierających loperamid u dzieci poniżej 6. roku życia. Ze względu na zawartość laktozy jednowodnej, lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.