

Tantum Verde rozpylać – 30ml

Tantum Verde rozpylać – 30ml

Opis produktu:

Aerozol do stosowania w jamie ustnej i gardle.

Skład 100 ml roztworu zawiera substancję czynną 0,15 g chlorowodoru benzydaminu oraz substancje pomocnicze: glicerol, etanol 96°, parahydroksybenzoetan metylu, kompozycję smakową mięty, sacharynę, wodorowęglan sodu, polisorbat 20, wodę oczyszczoną.

Jak to działa Tantum Verde w postaci sprayu do stosowania w jamie ustnej i gardle zawiera substancję czynną benzydaminę, należącą do indolowych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) do stosowania miejscowego i ogólnoustrojowego.

Benzydaminę charakteryzuje się właściwościami przeciwzapalnymi i przeciwbólowymi oraz miejscowo znieczulającymi i dezynfekującymi.

Lek dobrze wchłania się miejscowo, osiągając wysokie stężenia w tkankach objętych procesem zapalnym.

Lek jest dobrze tolerowany i nadaje się do miejscowego leczenia objawów zapalnych.

Wskazania

Preparat stosuje się w stanach zapalnych jamy ustnej i gardła (ból, zaczerwienienie, obrzęk), w zakażeniach bakteryjnych i wirusowych, zapaleniu krtani, stanach zapalnych błon śluzowych po radioterapii, stanach po zabiegach laryngologicznych i stomatologicznych, a także po intubacji.

Dawkowanie

Dzieci i młodzież Dzieci do lat 6: 1 dawka leku (aerozol) na 4 kg masy ciała, 2 do 6 razy dziennie.

Bez względu na masę ciała pojedyncza dawka nie powinna przekraczać 4 dawek.

Dzieci od 6 do 12 roku życia: 4 dawki leku 2 do 6 razy dziennie.

Dzieci powyżej 12. roku życia: od 4 do 8 dawek leku od 2 do 6 razy dziennie.

Dorośli Od 4 do 8 dawek (rozpyleń) leku 2 do 6 razy dziennie.

Każda dawka leku zawiera 0,17 ml roztworu.

Przeciwwskazania

Lek jest przeciwwskazany u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub którykolwiek ze składników leku.

Substancja pomocnicza tego leku (parahydroksybenzoesan metylu) może powodować reakcję alergiczną.

Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10 000 osób) i nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): reakcje anafilaktyczne, uczucie pieczenia w jamie ustnej, suchość w ustach, nudności i wymioty, reakcje nadwrażliwości, nieprawidłowe czucie, drętwienie, zawroty głowy i ból głowy , wysypka.

Objawy miejscowe są związane z farmakodynamicznym działaniem benzydamininy, która m.in. działa miejscowo znieczulająco.

Miejscowe skutki uboczne są zwykle przemijające, samoograniczające się i rzadko wymagają dodatkowego leczenia.

Benzydamina stosowana miejscowo jest wchłaniana do krążenia w niewielkich ilościach, dlatego ogólne skutki uboczne są bardzo rzadkie.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą, w tym o wszelkich możliwych działaniach niepożądanych niewymienionych w tej ulotce.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany stanowi zagrożenie dla Twojego życia lub zdrowia.