

Versic Emulsja przeciwgrzybiczo złuszcząca – 110ml

Versic Emulsja przeciwgrzybiczo-złuszcząca – 110ml

Wskazania:

Łupież pstry, powierzchowne grzybice skóry wymagające jednoczesnego powierzchownego złuszczenia.

Versic dzięki zawartości piroktonu olaminy i kwasu mlekowego działa przeciwgrzybiczo i złuszcząco. Jednoczesne stosowanie substancji hamującej rozwój grzybicy ze składnikiem powodującym powierzchowne złuszczenie zwiększa szybkość i skuteczność działania preparatu. Nowoczesna formuła emulsji pozwala na jej stosowanie z wysokim komfortem użytkowania.

Aktywne składniki*:

PIROKTON OLAMINY (0,5%) – mieszanina dwóch związków działa przeciwzapalnie i niweluje mikroflorę obecną w zmianach łupieżowych. Hamuje rozwój grzyba odpowiedzialnego za objawy łupieżu – *Pityrosporum Ovale* (*Malassezia Furfur*). Normalizuje i przywraca równowagę mikroflory naskórka, zapobiegając nawrotom łupieżu.

KWAS MLEKOWY (5,0%) – należy do grupy alfa-hydrokys kwasów (AHA). Występuje naturalnie w organizmie człowieka, dlatego jest nietoksyczny i całkowicie bezpieczny. Kwas mlekowy działa delikatnie, nie podrażnia i jest bezpieczny w użyciu, a przy tym bardzo skuteczny. Posiada właściwości złuszczące. Nawilża, pomaga utrzymać fizjologiczne pH skóry, stymuluje syntezę ceramidów. Stężenie kwasu mlekowego zastosowane w emulsji VERSIC osłabia wzajemne przyleganie korneocytów, w wyniku czego usuwany jest zrogowaciały naskórek.

JAK UŻYWAĆ

Emulsję stosować dwa razy dziennie (rano i wieczorem) przez 7-10 dni.

Emulsję należy pozostawić na skórze do wchłonięcia bez zmywania.

W przypadku łupieżu pstrego wskazane jest stosowanie szamponu przeciwłupieżowego Capitis Duo do mycia głowy (codziennie przez 7-10 dni) i powtarzanie aplikacji (Versic + Capitis Duo)

przez 4 kolejne dni po miesiącu i dwóch miesiącach . Takie postępowanie zmniejsza ryzyko ponownego pojawienia się łupieżu pstrego.

Jeżeli łupież pstry pojawił się w postaci jasnych plam na skórze, objaw ten nie zniknie podczas stosowania preparatu. Jasne plamy znikną podczas naturalnego procesu opalania skóry po zakończeniu aplikacji.

Podczas stosowania preparatu i przez kolejne 5 dni nie należy wystawiać skóry na działanie promieni UV.

KOMPOZYCJA

Aqua, węglan diakaprylu, rezorcynol, ketokonazol, styren sodu, kopolimer akrylanów, poliakrylan sodu, fenoksyetanol, metyloparaben, etyloparaben, propyloparaben.

Tagi produktów

Łupież