Visine Comfort krople do oczu 15 ml

Opis

Visine Comfort zawiera substancję czynną chlorowodorek tetryzoliny. Należy on do grupy kropli stosowanych w okulistyce w celu zmniejszenia przekrwienia. Visine Comfort łagodzi zaczerwienienia i podrażnienia. Wskazaniem do stosowania Visine Comfort jest doraźne leczenie zaczerwienienia oka, będącego skutkiem niewielkich, niezakaźnych podrażnień, spowodowanych np. przez dym, kurz, wiatr, chlorowaną wodę, światło lub alergie

Składniki

Visine Comfort zawiera tetryzoliny. 1 ml kropli do oczu, roztworu zawiera 0,5 mg chlorowodorku tetryzoliny (tj. 21 mikrogramów (µg) na kroplę) oraz substancje pomocnicze, m.in.0,18 mg fosforanu (tj.7,5 µg/kroplę).

Dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 6 lat: dawka wynosi 1–2 krople do chorego oka (oczu) 2 do 3 razy na dobę. Produkt leczniczy należy stosować przez najkrótszy czas niezbędny do złagodzenia objawów. U dzieci w wieku poniżej 12 lat zaleca się nadzór osoby dorosłej. Dzieci w wieku powyżej 2 lat do poniżej 6 lat: stosować wyłącznie po konsultacji z personelem medycznym. Zalecana dawka to 1 kropla do chorego oka (oczu) 2 do 3 razy na dobę. Produkt leczniczy jest przeciwwskazany u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Po otwarciu zakrętki butelkę należy odwrócić do góry dnem, a następnie lekko ścisnąć w celu odmierzenia 1 lub 2 kropli z końcówki zakraplacza do oka, bez

dotykania oka. Aby uniknąć zanieczyszczenia roztworu, końcówka butelki nie powinna stykać się z przedmiotami innymi niż zakrętka.

Kiedy nie stosować

Kiedy nie stosować: jeśli pacjent ma uczulenie na chlorowodorek tetryzoliny lub którykolwiek z pozostałych składników lub jeśli pacjent ma jaskrę z wąskim kątem przesączaniau dzieci w wieku poniżej 2 lat

Działania niepożądane

Może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Rzadko (występujące nie częściej niż u 1 na 1000 osób): rozszerzenie źrenicy Bardzo rzadko (występujące nie częściej niż u 1 na 10 000 osób): suchość spojówek z zamknięciem punktów łzowych po długotrwałym stosowaniu tetryzoliny, łzawienie oczu po długotrwałym stosowaniu tetryzoliny Często (występujące nie częściej niż u 1 na 10 osób): podrażnienie oka (ból, kłucie, pieczenie), pogorszenie ostrości wzroku, przekrwienie z odbicia, uczucie pieczenia błon śluzowych, suchość błon śluzowych. Częstość nieznana (nie można jej oszacować na podstawie dostępnych danych): zwiększone łzawienie, pieczenie oczu lub wokół oczu, zaczerwienienie, podrażnienie, obrzęk, ból, swędzenie

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
- Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub

ostatnio, a także o lekarz, które pacjent planuje stosować. W przypadku stosowania leków przeciwdepresyjnych zwanych inhibitorami monoaminooksydazy lub trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych należy unikać ich jednoczesnego stosowania z Visine Comfort, ponieważ może to doprowadzić do zwiększenia ciśnienia tętniczego krwi. Nie stosować z innymi lekami Visine i/lub lekami zawierającymi tetryzoliny chlorowodorek.

- Przed użyciem Visine Comfort zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem.
- Visine Comfort jest do stosowania u dorosłych i dzieci powyżej 6. roku życia. U dzieci w wieku powyżej 2 lat do poniżej 6 lat Visine Comfort można stosować wyłącznie po konsultacji z personelem medycznym.
- Produkty lecznicze stosowane do oczu mogą powodować przemijające zaburzenia widzenia (niewyraźne widzenie i rozszerzenie źrenic), które upośledzają zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.