Xenna Balance Junior 14 saszetek

Opis

Xenna Balance Junior to wyrób medyczny w postaci saszetek stosowany w przypadku zaparć u dzieci. Produkt zawiera składniki wspomagające regulację wydalania. Wskazany jest w sytuacjach, gdy konieczne jest przywrócenie prawidłowej pracy jelit. Opinie dotyczące produktu sugerują jego stosowanie jako wsparcie w terapii problemów z zaparciami. Należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotce.

Składniki

Jedna saszetka zawiera 5 g makrogolu 3350. Substancje pomocnicze: dwutlenek krzemu, aromat, sacharynian sodu.

Przeznaczenie produktu

Xenna Balance Junior jest wyrobem medycznym o osmotycznym działaniu przeczyszczającym, który w naturalny sposób reguluje pracę jelit. Jest szczególnie zalecany w przypadku przewlekłych zaparć i w sporadycznych przypadkach nieregularnej pracy jelit.

Sposób użycia

Dzieci od 6 miesiąca życia do 2 lat (o masie ciała do 12 kg): 1-2 saszetki (5 g każda) na dzień. Dzieci od 2 do 11 roku życia (o masie ciała od 12 kg do 20 kg): 2-4 saszetki (5 g każda) na dzień. Dzieci powyżej 11 roku życia (lub o masie ciała powyżej 20 kg): 2-6 saszetek (5 g każda) na dzień. Zawartość jednej saszetki należy rozpuścić w 62,5 ml (około

1/4 szklanki) niegazowanej wody. Dawkę dobową można podzielić i przyjmować w kilku porcjach w ciągu dnia. Dawkę można zwiększyć lub zmniejszyć w zależności od indywidualnej reakcji na leczenie. W tym celu zaleca się zawsze skontaktować z lekarzem. Przed podaniem produktu dzieciom należy zawsze zasięgnąć porady lekarskiej. Zazwyczaj maksymalna dobowa dawka nie przekracza 6 saszetek.

Zawartość opakowania

Xenna Balance Junior ma postać proszku do przygotowania roztworu doustnego. Pudełko zawiera 14 jednorazowych saszetek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Możliwe działania niepożądane Xenna Balance Junior:

- W przypadku stosowania dawek wymaganych do osiągniecia efektu terapeutycznego, nigdy nie odnotowano żadnych działań niepożądanych.
- Rzadko mogą wystąpić dolegliwości żołądkowo-jelitowe, burczenie w brzuchu, bóle brzucha, nudności i lekkie biegunki (szczególnie na początku stosowania).
- Rzadko występują reakcje uczuleniowe (wysypka lub pokrzywka).